

Kommentierte Formelsammlung der deskriptiven und induktiven Statistik für Wirtschaftswissenschaftler

Prof. Dr. Irene Rößler
Prof. Dr. Albrecht Ungerer

**Weitere Beispiele und ausführliche Erläuterungen sowie
detaillierte Lösungen der Aufgaben im Buch:
Rößler/Ungerer (2019): Statistik für
Wirtschaftswissenschaftler
Springer Gabler**

Zusätzliche Übungsaufgaben zu Kapitel 4 und 5 des Buches unter
www.prof-roessler.de/Dateien/Statistik/uebungsaufgaben.pdf
Ausführliche Lösungen hierzu unter
www.prof-roessler.de/Dateien/Statistik/stichproben.pdf

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	1
Phasen einer statistischen Erhebung	1
Merkmalsarten und Skalen	1
Regeln für die Erstellung von Tabellen	2
Grundformen grafischer Darstellungen	2
Beispieldatensatz	3
2 Deskriptive Statistik: Univariate Verteilungen	4
2.1 Darstellungsformen	4
Klassierte Daten, Histogramm	6
2.2 Maßzahlen der zentralen Tendenz	8
Mittelwerte und Verteilungsformen	8
Ergänzungen	9
2.3 Maßzahlen der Streuung	10
Varianzzerlegung bei m Untergruppen ($j = 1, \dots, m$)	10
Ergänzungen	11
3 Deskriptive Statistik: Bivariate Verteilungen	12
3.1 Darstellungsformen	12
Häufigkeitsverteilung	12
Statistische Unabhängigkeit	12
Korrelation	13
3.2 Maßzahlen des rechnerischen Zusammenhangs	14
Ergänzung: PRE-Maße (Proportional Reduction in Error)	15
4 Wahrscheinlichkeitsrechnung	16
4.1 Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	16
Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung	16
Praktische Berechnung von Wahrscheinlichkeiten	16
Wahrscheinlichkeitsverteilungen	17
4.2 Die Normalverteilung als Stichprobenverteilung	18
Häufig angewandte Stichprobenverteilungen und ihre Parameter	19
5 Induktive Statistik	20
5.1 Grundlagen des Schätzens und Testens	20
5.2 Schätzverfahren	21
Einfache Zufallsstichproben	21
Geschichtete Zufallsstichproben	22
Häufig angewandte Konfidenzintervalle	23
5.3 Testverfahren	24
Signifikanztest	24

Hinweis zur Interpretation	24
Fehlermöglichkeiten bei Tests	25
Praktische Vorgehensweise beim klassischen Signifikanztest	26
Häufig angewandte Testverfahren	27
6 Wirtschaftsstatistische Anwendungen	28
6.1 Disparitätsmessungen	28
6.2 Bestands- und Bewegungsmassen	29
6.3 Indexzahlen	30
6.4 Regressionsrechnung	31
6.5 Zeitreihenanalyse	32
Häufig angewandte Prognoseverfahren mit exponentieller Glättung	33
6.6 Die Normalverteilung als Risikoverteilung	34
6.7 Stichproben im Rechnungswesen, Stichprobeninventur	35
Anhang: Tafeln zu einigen wichtigen Verteilungen	37
A Standardnormalverteilung	37
B t -Verteilung	38
C Chi-Quadrat-Verteilung	39
D F -Verteilung	40

1 Grundlagen

Statistik, als Methodenlehre und nicht als Zahlenergebnis verstanden ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur Gewinnung, Beschreibung und Analyse von in Zahlen abbildbaren empirischen Befunden beschäftigt. Sie soll in einem Entscheidungsprozess informative Daten liefern; insbesondere soll sie helfen, Theorien an der Realität zu überprüfen.

Phasen einer statistischen Erhebung

- Fragestellung (Formulierung einer praktischen Entscheidung oder wissenschaftlichen Theorie so, dass eine statistische Messung möglich ist: Grundprobleme der „empirischen Sozialforschung“)
- Festlegung der statistischen (Grund-) Gesamtheit [Bestimmung der sachlichen, zeitlichen (Zeitpunkt: Bestandsmasse; Zeitraum: Bewegungsmasse) und räumlichen Identifikationsmerkmale]
- Wahl der Erhebungsmerkmale und insbesondere bei nominalen und ordinalen Merkmalen Entwurf einer Messskala
- Wahl des Erhebungsverfahrens (z.B. schriftliche bzw. mündliche Befragung, Beobachtung, Experiment; Primär- oder Sekundärerhebung; Voll- oder Teilerhebung)
- Organisation, Durchführung und Kontrolle
- Aufbereitung der Daten (Ordnen, Datenverdichtung)
- Auswertung (Datenanalyse und Interpretation der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung unter Berücksichtigung des Einflusses der Phasen der Datenentstehung)
- Darstellung der Ergebnisse (tabellarische und grafische Darstellung)

Gestaltungsbeschränkung durch Rahmenbedingungen (z.B. rechtliche) und ein „ökonomisches Prinzip“ (Abwägung: aktuell–billig–genau).

Merkmalsarten und Skalen

Merkmalsart	Skala	Interpretation	Transformation	Beispiel
qualitativ	rein qualitativ Nominalskala	1. Verschiedenartigkeit	eindeutige Transformationen	Beruf, Fachrichtung, Familienstand, Geschlecht, Körpergröße(?)
	komparativ Ordinalskala	1. Verschiedenartigkeit 2. Ordnung	streng monotone Transformationen	Note, Kreditranking, Zufriedenheitsgrad, soziale Schicht, Körpergröße(?)
quantitativ	Intervallskala	1. Verschiedenartigkeit 2. Ordnung 3. Differenzen	lineare Transformationen $y = ax + b$, $a > 0$	°Celsius, Normabweichung, Altersjahrgang, Körpergröße(?)
	Verhältnisskala	1. Verschiedenartigkeit 2. Ordnung 3. Differenzen 4. Verhältnisse	linear-homogene Transformationen $y = ax$, $a > 0$	°Kelvin, Alter in Jahren, Einkommen, Preis, Körpergröße

Regeln für die Erstellung von Tabellen

1. Jede Tabelle trägt eine Überschrift, in der die beschriebene statistische Masse sachlich, zeitlich und räumlich abzugrenzen ist.
2. Tabellenkopf und die Vorspalte enthalten die Erläuterung zum Zahlenteil. Jede Zahl im Zahlenteil ist somit charakterisiert durch die jeweilige Zeilen- (in der Vorspalte) und Spaltenbezeichnung (im Tabellenkopf). Kein Tabellenfeld sollte leer sein. Dabei bedeutet „–“ genau Null, während „0“ mehr als Null, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Darstellungseinheit bedeutet (auch 0,0 oder 0,00).
3. Fußnoten enthalten Erläuterungen zum Inhalt einer Tabelle sowie Quellenhinweise.

Bsp.: Tab ... Wohnbevölkerung der Stadt XY am 30.02.20.. (in Tsd.)

Geschlecht	Familienstand				Insgesamt
	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	
männl.	102	89	5	4	200
weibl.	109	90	15	6	220
Insgesamt	211	179	20	10	420

Quelle: Städtestatistisches Amt XY

Grundformen grafischer Darstellungen

<p>Balkendiagramm</p>	<p>Flächendiagramm</p>
<p>Streudiagramm</p>	<p>Kurvendiagramm</p>

Aufgabe

1

Erstellen Sie ein Kreisdiagramm des Merkmals Familienstand für das obige Beispiel der Wohnbevölkerung.

Beispieldatensatz

Bei 25 Teilnehmern einer Statistik-Klausur wird eine statistische Erhebung mit den Merkmalen

- Geschlecht (männlich 1, weiblich 2)
- Vertiefungsfach (Bank 1, Handel 2, Industrie 3)
- Mathematiknote des vorangegangenen Semesters (2, 3, 4)
- Ausgaben für Kopien im letzten Semester (Euro)
- Einkommen im letzten Semester (Euro)
- Anzahl gekaufter/ausgeliehener Fachbücher im letzten Semester
- erwartete Leistung (unterdurchschnittlich -1, durchschnittlich 0, eher besser +1)

durchgeführt. Man erhält folgende Datenmatrix: [\(als excel-Datei zum download\)](#)

Stud.-Nr.	Ge-schlecht	Vertiefungs-fach	Note	Ausgaben für Kopien €	Einkommen €	Anzahl Fachbücher	erwartete Leistung
1	2	2	3	21	2025	2	0
2	1	1	3	37	2220	1	0
3	1	2	2	26	2130	1	-1
4	2	3	3	68	2580	0	+1
5	1	2	4	16	1770	2	0
6	2	2	2	31	2160	1	0
7	1	3	4	24	2130	2	-1
8	2	3	2	6	1710	4	+1
9	2	2	2	22	1980	1	-1
10	1	3	4	32	2280	1	+1
11	2	1	3	17	2025	2	0
12	1	3	3	44	2325	0	0
13	1	1	3	30	2250	1	-1
14	2	2	2	12	1800	3	+1
15	1	3	4	57	2460	0	-1
16	1	3	3	41	2415	0	-1
17	2	1	2	20	1890	2	+1
18	2	2	2	19	2010	2	0
19	1	3	4	47	2370	0	-1
20	2	3	2	14	1965	3	+1
21	1	2	3	39	2235	1	0
22	2	3	2	18	1980	3	+1
23	2	2	2	2	1770	4	+1
24	1	2	3	10	1920	3	0
25	1	1	3	27	2100	1	+1

2 Deskriptive Statistik: Univariate Verteilungen

2.1 Darstellungsformen

Die erste Stufe einer Auswertung erhobener Daten umfasst die sinnvolle Ordnung der Merkmalswerte bzw. ihre Zusammenfassung zu Gruppen mit gleichen Merkmalsausprägungen. Die tabellarische oder grafische Darstellung der Häufigkeiten des Auftretens von Merkmalsausprägungen heißt Häufigkeitsverteilung.

Begriffe	Symbole
Statistische Masse (Grundgesamtheit) besteht aus statistischen Einheiten mit denselben Identifikationsmerkmalen.	Umfang: n (N) durchnummerierte (verschlüsselte, anonymisierte) statistische Einheiten: $i = 1, 2, \dots, n(N)$
Urliste enthält Beobachtungswerte des Merkmals X von n statistischen Einheiten.	$a_1, \dots, a_i, \dots, a_n$
Merkmalsausprägungen des Merkmals X	$x_1, \dots, x_j, \dots, x_m$
absolute Häufigkeit der Ausprägung x_j	$h_j = h(x_j)$ mit $\sum_{j=1}^m h_j = n$
relative Häufigkeit von x_j	$f_j = f(x_j) = \frac{h_j}{n}$ mit $\sum_{j=1}^m f_j = 1$
relative Häufigkeitsfunktion	$f(x) = \begin{cases} f_j & \text{für } x = x_j, j = 1, \dots, m \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
kumulierte absolute Häufigkeit von x_j des mindestens ordinalen Merkmals X	$H_j = H(x_j)$ mit $H_j = \sum_{k=1}^j h_k, x_k < x_{k+1}, H_m = n$
kumulierte relative Häufigkeit von x_j des mindestens ordinalen Merkmals X	$F_j = F(x_j)$ mit $F_j = \sum_{k=1}^j f_k = \frac{H_j}{n}, x_k < x_{k+1}, F_m = 1$
Empirische Verteilungsfunktion	$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < x_1 \\ F_j & \text{für } x_j \leq x < x_{j+1}, j = 1, \dots, m-1 \\ 1 & \text{für } x \geq x_m \end{cases}$

Aufgabe


2

Bei einer Erhebung stellt man folgende Personenzahl je Wohnung in den 40 Sozialwohnungen einer Stadt fest (Urliste):


5,2,1,4,6, 3,2,4,4,7, 6,1,2,3,5, 3,3,4,3,3 0,5,2,4,3, 3,6,5,6,4, 3,5,3,4,3, 3,5,7,3,4.

Berechnen Sie in tabellarischer Form absolute und relative Häufigkeiten sowie die kumulierten Häufigkeiten. Zeichnen Sie die Häufigkeitsverteilungen.


Relative Häufigkeiten




Relative Häufigkeitsfunktion



Kumulierte relative Häufigkeiten



Empirische Verteilungsfunktion



Klassierte Daten, Histogramm

Bei quantitativen Merkmalen mit sehr vielen Ausprägungen (z.B. Einkommen) oder bei stetigen Merkmalen werden zur Erhebung bzw. vor der Auszählung benachbarte Beobachtungswerte zu Klassen zusammengefasst. Die Klassengrenzen dürfen sich nicht überschneiden. Die Wahl der Klassenbreiten hängt einerseits von der Erhebbarkeit, andererseits vom gewünschten Informationsgehalt und der Klassenbesetzung ab. Weisen die Klassen eine unterschiedliche Breite auf, so werden zur Vermeidung von Missverständnissen die Klassenhäufigkeiten auf die Klassenbreiten bezogen. Als Ergebnis erhält man die besser vergleichbaren Besetzungsdichten je Klasse. Diese werden in Histogrammen auf der Ordinate abgetragen, die Häufigkeiten somit als Rechteckflächen dargestellt. Die Dichtefunktionen innerhalb der Klassen entsprechen also Rechteckverteilungen (einfachstes Modell).

Begriffe	Symbole
m Klassen (von ... bis unter ...)	$[a_1, b_1), \dots, [a_j, b_j), \dots, [a_m, b_m)$
Klassenbreite / Klassenmitte	$w_j = b_j - a_j$ / $\tilde{x}_j = \frac{a_j + b_j}{2}$
absolute / relative Häufigkeit	$h_j = \sum_{x_i \in [a_j, b_j)} h(x_i)$ mit $\sum_{j=1}^m h_j = n$ / $f_j = \frac{h_j}{n}$ mit $\sum_{j=1}^m f_j = 1$
absolute / relative Dichte	$h_j^* = \frac{h_j}{w_j}$ mit $\sum_{j=1}^m h_j^* w_j = n$ / $f_j^* = \frac{f_j}{w_j}$ mit $\sum_{j=1}^m f_j^* w_j = 1$
Klassierte Dichtefunktion	$f^*(x) = \begin{cases} f_j^* & \text{für } x \in [a_j, b_j), j = 1, \dots, m \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ mit $\int_{a_1}^{b_m} f^*(x) dx = 1$
kumulierte abs. / rel. Häufigk.	$H_j = \sum_{k=1}^j h_k$ mit $H_m = n$ / $F_j = \sum_{k=1}^j f_k = \frac{H_j}{n}$ mit $F_m = 1$
Klassierte Verteilungsfunktion	$F^*(x) = \int_{a_1}^x f^*(u) du$ $= \begin{cases} 0 & \text{für } x < a_1 \\ F_{j-1} + f_j^*(x - a_j) & \text{für } x \in [a_j, b_j), j = 1, \dots, m \\ 1 & \text{für } x \geq b_m \end{cases}$

Aufgabe

3

Einkommen von ... bis unter ... €	%
0 – 500	10
500 – 1.000	25
1.000 – 1.250	25
1.250 – 1.500	15
1.500 – 2.000	15
2.000 – 3.000	5
3.000 – 5.000	5


Zur Analyse der sog. „Altersarmut“ wird eine Erhebung zur Einkommenslage (monatliche Renten und sonstige Einkommen von Einzelpersonen) von Rentnern herangezogen. Zeichnen Sie ein Histogramm und die klassierte Verteilungsfunktion. Schätzen Sie nach der Grafik, wieviel Prozent über weniger als 1 150 € verfügen.

Histogramm


Ergebnis einer Schnellinventur

Teile von ... bis unter ... €			$f_j \cdot 100$	$f_j^* \cdot 100$
0	–	1	10	10
1	–	4	20	6,7
4	–	10	30	5
10	–	20	40	4


falsche Darstellung:




richtige Darstellung:




Histogramm



Kumulierte relative Häufigkeiten



Klassierte Verteilungsfunktion






2.2 Maßzahlen der zentralen Tendenz

In der zweiten Stufe der Auswertung werden Beobachtungswerte bzw. Häufigkeitsverteilungen zu Maßzahlen verdichtet. Im Sachzusammenhang sinnvolle Maßzahlen sollen so u.a. – sofern sie nicht selbst Untersuchungsziel sind – einen übersichtlichen Vergleich verschiedener statistischer Reihen erlauben.

Mittelwerte	Symbol	Berechnung	Skalenniveau	Aussage
Modus (häufigster Wert, Dichtemittel)	D	$D = x_k$ mit $h_k = \max_j h_j$	beliebig	Die Merkmalsausprägung einer Verteilung, auf die die meisten Beobachtungswerte entfallen.
Median (Zentralwert, 2. Quartil)	Z	$Z = a_{(k)}$ mit $k = \frac{n+1}{2}$ für n ungerade und $k = \frac{n}{2}$ für n gerade, a_i der Größe nach geordnet. Für $Z = x_j$ gilt: $F(x_j) = 0,5$.	ordinal oder metrisch	Der Beobachtungswert einer der Größe nach geordneten Reihe ($a_{(i)}$), unterhalb dem die Hälfte aller Merkmalsträger liegt. Echte „Mitte“. Bei Verteilungen mit nur wenigen Beobachtungswerten als Deskription oft nicht sinnvoll.
Arithmetisches Mittel	\bar{x} (μ)	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ $= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m h_j x_j$ $= \sum_{j=1}^m f_j x_j$	metrisch	Die Größe, die sich ergibt, wenn die Merkmalssumme gleichmäßig auf die Merkmalsträger aufgeteilt wird. Zur Beschreibung der „Mitte“ einer Verteilung nur bei symmetrischen Verteilungen geeignet.

Mittelwerte und Verteilungsformen



symmetrisch	linkssteil	rechtssteil
 <p>$\bar{x} = D = Z$</p>	 <p>$D < Z < \bar{x}$</p>	 <p>$\bar{x} < Z < D$</p>

Aufgabe

4

Berechnen Sie für die 2. Aufgabe die drei behandelten Mittelwerte.

Ergänzungen

Modalklasse	$[a_D, b_D) = [a_k, b_k)$ mit $h_k^* = \max_j h_j^*$	Die am dichtesten besetzte Klasse.
Quantile z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Perzentile • Dezile • Quartile Q_k 	$F^*(x_k) = k$  1%-Schritte ($k \in \{1, 2, \dots, 99\}$) 10%-Schritte ($k \in \{1, 2, \dots, 9\}$) 25%-Schritte ($k \in \{1, 2, 3\}$)	Die Merkmalsausprägung x_k , unterhalb der z.B. 99% der Werte (99. Perzentil) 90% der Werte (9. Dezil) 75% der Werte (3. Quartil) liegen.
Arithmetisches Mittel \bar{x} <ul style="list-style-type: none"> • Hochrechnungseigenschaft • lineare Transformation • Arithmetisches Mittel aus arithmetischen Mitteln 	 $n \cdot \bar{x} = \sum_{i=1}^n a_i = X$ $z_i = c + d \cdot a_i \implies \bar{z} = c + d \cdot \bar{x}$ $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m n_j \bar{x}_j$ mit $n = \sum_{j=1}^m n_j$ $\hat{\bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m h_j \tilde{x}_j$ mit $\tilde{x}_j = \frac{a_j + b_j}{2}$	Das arithmetische Mittel enthält als wichtigste Information die Merkmalssumme. Arithmetisches Mittel aus arithmetischen Mitteln von m Untergruppen. Schätzung des arith. Mittels bei klassierter Verteilung, falls \bar{x}_j unbekannt.
Geometrisches Mittel g	$g = \sqrt[T]{\frac{x_1}{x_0} \cdot \frac{x_2}{x_1} \cdots \frac{x_T}{x_{T-1}}} = \sqrt[T]{\frac{x_T}{x_0}}$ mit $\frac{x_t}{x_{t-1}}$: Messzahlen aus äquidistant gemessenen Größen, $t = 1, \dots, T$	Durchschnittliche Wachstumsfaktoren wirtschaftsstatistischer Zeitreihen. [Z.B. Durchschnittsverzinsung bei Wiederanlage der Zinsen.]
Harmonisches Mittel h	$h = \frac{\sum g_i}{\sum g_i \cdot x_i^{-1}} = \left(\frac{\sum g_i \cdot x_i^{-1}}{\sum g_i} \right)^{-1}$ $\left[= \frac{\sum km}{\sum km \cdot \left(\frac{km}{Std} \right)^{-1}} = \frac{\sum km}{\sum Std} \right]$	Durchschnittsgrößen, wenn sich die gegebenen Gewichte auf Zählergrößen beziehen. [Z.B. Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn die Gewichte Teilstrecken sind.]


Aufgabe

5

Berechnen Sie für die 3. Aufgabe die Modalklasse, die Quartile und das arithmetische Mittel.

2.3 Maßzahlen der Streuung

Maßzahlen der Streuung sollen die Variation der Einheiten in den Merkmalsausprägungen abbilden, bei quantitativen Merkmalen besonders bezüglich eines Mittelwertes. So gesehen sind sie auch eine Maßgröße für den Informationsgehalt eines Mittelwertes als Abbildungsergebnis einer statistischen Verteilung.

Streuungsmaße	Symbol	Berechnung	Skalenniveau	Aussage
Homogenitätsindex	P	$P = \frac{m}{m-1} \left(1 - \sum_{j=1}^m f_j^2\right),$ $0 \leq P \leq 1$	beliebig	P ist bei der Gleichverteilung am größten und bei der Einpunktverteilung am geringsten.
Quartilsabstand • Box-and-Whisker Plot	QA	$QA = Q_3 - Q_1$ 	ordinal oder metrisch	QA gibt den mittleren Bereich der Beobachtungswerte einer der Größe nach geordneten Reihe an, unterhalb bzw. oberhalb dem je ein Viertel der Merkmalsträger liegt. Bei ordinalen Merkmalen nur sinnvoll, wenn nicht die Differenz ausgerechnet wird (so allerdings keine Maßzahl).
Varianz und Standardabweichung	s^2 (σ^2) s (σ) $s = +\sqrt{s^2}$	$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{x})^2$ $= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^2 - \bar{x}^2$ $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m h_j (x_j - \bar{x})^2$ $= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m h_j x_j^2 - \bar{x}^2$	metrisch	s^2 ist ein Durchschnitt aus quadrierten Differenzen zwischen Beobachtungswert und dem arithmetischen Mittel. Größere Differenzen werden stärker gewichtet als kleine. Verschiebungssatz

Varianzzerlegung bei m Untergruppen ($j=1, \dots, m$)

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{x})^2 = \underbrace{\frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (a_{ij} - \bar{x}_j)^2}_{s_{\text{int}}^2} + \underbrace{\frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^m n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2}_{s_{\text{ext}}^2} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^m n_j \cdot s_j^2 + s_{\text{ext}}^2 = s_{\text{int}}^2 + s_{\text{ext}}^2$$

Die Gesamtvarianz lässt sich bei Einteilung einer Gesamtheit in Gruppen so zerlegen, dass ein Teil die Streuung der Einzelwerte innerhalb der Gruppen (s_{int}^2), der andere Teil die Streuung zwischen den Mittelwerten der Gruppen (s_{ext}^2) abbildet.

Aufgabe 6

Berechnen Sie für die 2. Aufgabe den Quartilsabstand und die Standardabweichung.

Aufgabe 7

Nehmen Sie eine Varianzzerlegung für das Vertiefungsfach ($j = 1, 2, 3$) und die Ausgaben für Kopien (a_{ij}) des Beispieldatensatzes Seite 3 vor.

Ergänzungen

Spannweite R	$R = a_{\max} - a_{\min}$	Differenz zwischen größtem und kleinstem Beobachtungswert, z.B. bei Preis-/Kursentwicklungen.
Durchschnittliche (mittlere absolute) Abweichung d_A • Minimum-eigenschaft von d_Z	$d_A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i - A $ $= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m h_j x_j - A $ $= \sum_{j=1}^m f_j x_j - A , \quad A = \bar{x}, Z, \dots$ $d_A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i - A = \min \text{ für } A = Z$	Da $\sum_i (a_i - \bar{x}) = 0$ gilt (Schwerpunkteigenschaft des arith. Mittels), bildet man das arith. Mittel der Absolutbeträge der Abweichungen der Beobachtungswerte vom arith. Mittel ($A = \bar{x}$). Als Bezugspunkt der Abweichungen der Beobachtungswerte kann auch der Median Z oder ein anderer Mittelwert gewählt werden.
Varianz • Minimum-eigenschaft • lineare Transformation • z-Transformation (Standardisierung) • Varianz bei klassierten Daten	$s_A^2 = \frac{1}{n} \sum_i (a_i - A)^2 = \min \text{ für } A = \bar{x}$ $s_A^2 = \frac{1}{n} \sum_i (a_i - \bar{x})^2 + (\bar{x} - A)^2$ $z_i = c + d \cdot a_i \implies s_Z^2 = d^2 \cdot s_X^2$ mit $s_X^2 = \frac{1}{n} \sum_i (a_i - \bar{x})^2$ $z_i = \frac{a_i - \bar{x}}{s} \implies \bar{z} = 0 \text{ und } s_Z^2 = 1$ $\hat{s}^2 = \underbrace{\sum_{j=1}^m f_j \frac{w_j^2}{12}}_{\hat{s}_{\text{int}}^2} + \underbrace{\sum_{j=1}^m f_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2}_{s_{\text{ext}}^2}$	<p>Die mittlere quadratische Abweichung bezogen auf das arith. Mittel ist stets kleiner als die mittlere quadratische Abweichung bezogen auf einen beliebigen Wert A.</p> <p>Aus rechnerischen Gründen bzw. wegen des Vergleichs zwischen verschiedenen Merkmalen werden Daten oft z-transformiert.</p> <p>Dabei getroffene Annahme: Rechteckverteilung innerhalb einer Klasse. Falls \bar{x}_j unbekannt ist, wird \tilde{x}_j verwendet.</p>
Variationskoeffizient V	$V = \frac{s}{\bar{x}}, \quad x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m$ und $\bar{x} > 0$	Relatives Streuungsmaß (dimensionslos): Die Standardabweichung wird auf das arithmetische Mittel bezogen.

Aufgabe

8




Berechnen Sie für die 2. Aufgabe den Variationskoeffizienten und für die 3. Aufgabe den Quartilsabstand und die Standardabweichung.

3 Deskriptive Statistik: Bivariate Verteilungen

3.1 Darstellungsformen

Werden an einem Merkmalsträger i zwei Beobachtungswerte a_i und b_i der Merkmale X und Y festgestellt, so kann untersucht werden, ob ein rechnerischer Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen besteht. In tabellarischer Form geschieht dies bei Häufungen von gleichen Beobachtungspaaren durch eine Häufigkeitstabelle (Assoziations-, Kontingenz-, Korrelationstabelle), sonst durch eine der Größe (eines Merkmals) nach geordnete Reihe der Beobachtungspaare (nicht bei nominalen Merkmalen möglich). Die Auswertung erfolgt im ersten Fall durch Spalten- bzw. Zeilenvergleich, im zweiten Fall (vor allem grafisch) durch Reihenfolgenvergleich.

Häufigkeitsverteilung

Zweidimensionale Häufigkeitstabelle	Bedingte Verteilungen																																																																																																			
Notation: x_j mit $j = 1, \dots, k$ y_i mit $i = 1, \dots, m$	Zeilenvergleich (y_i festgehalten)	Spaltenvergleich (x_j festgehalten)																																																																																																		
<table><tr><td></td><td>x_1</td><td>...</td><td>x_j</td><td>...</td><td>x_k</td><td>Σ</td></tr><tr><td>y_1</td><td>h_{11}</td><td>...</td><td>h_{1j}</td><td>...</td><td>h_{1k}</td><td>$n_{1\bullet}$</td></tr><tr><td>\vdots</td><td>\vdots</td><td></td><td>\vdots</td><td></td><td>\vdots</td><td>\vdots</td></tr><tr><td>y_i</td><td>h_{i1}</td><td>...</td><td>h_{ij}</td><td>...</td><td>h_{ik}</td><td>$n_{i\bullet}$</td></tr><tr><td>\vdots</td><td>\vdots</td><td></td><td>\vdots</td><td></td><td>\vdots</td><td>\vdots</td></tr><tr><td>y_m</td><td>h_{m1}</td><td>...</td><td>h_{mj}</td><td>...</td><td>h_{mk}</td><td>$n_{m\bullet}$</td></tr><tr><td>Σ</td><td>$n_{\bullet 1}$</td><td>...</td><td>$n_{\bullet j}$</td><td>...</td><td>$n_{\bullet k}$</td><td>n</td></tr></table>		x_1	...	x_j	...	x_k	Σ	y_1	h_{11}	...	h_{1j}	...	h_{1k}	$n_{1\bullet}$	\vdots	\vdots		\vdots		\vdots	\vdots	y_i	h_{i1}	...	h_{ij}	...	h_{ik}	$n_{i\bullet}$	\vdots	\vdots		\vdots		\vdots	\vdots	y_m	h_{m1}	...	h_{mj}	...	h_{mk}	$n_{m\bullet}$	Σ	$n_{\bullet 1}$...	$n_{\bullet j}$...	$n_{\bullet k}$	n	<table><tr><td>x_j</td><td>$\frac{h_{1j}}{n_{1\bullet}}$</td><td>$\frac{h_{ij}}{n_{i\bullet}}$</td><td>$\frac{h_{mj}}{n_{m\bullet}}$</td></tr><tr><td>$x_1$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>x_2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\vdots</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>x_k</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x_j	$\frac{h_{1j}}{n_{1\bullet}}$	$\frac{h_{ij}}{n_{i\bullet}}$	$\frac{h_{mj}}{n_{m\bullet}}$	x_1				x_2				\vdots				x_k					1	1	1	<table><tr><td>y_i</td><td>$\frac{h_{i1}}{n_{\bullet 1}}$</td><td>$\frac{h_{ij}}{n_{\bullet j}}$</td><td>$\frac{h_{ik}}{n_{\bullet k}}$</td></tr><tr><td>$y_1$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>y_2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\vdots</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>y_m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		y_i	$\frac{h_{i1}}{n_{\bullet 1}}$	$\frac{h_{ij}}{n_{\bullet j}}$	$\frac{h_{ik}}{n_{\bullet k}}$	y_1				y_2				\vdots				y_m					1	1	1
	x_1	...	x_j	...	x_k	Σ																																																																																														
y_1	h_{11}	...	h_{1j}	...	h_{1k}	$n_{1\bullet}$																																																																																														
\vdots	\vdots		\vdots		\vdots	\vdots																																																																																														
y_i	h_{i1}	...	h_{ij}	...	h_{ik}	$n_{i\bullet}$																																																																																														
\vdots	\vdots		\vdots		\vdots	\vdots																																																																																														
y_m	h_{m1}	...	h_{mj}	...	h_{mk}	$n_{m\bullet}$																																																																																														
Σ	$n_{\bullet 1}$...	$n_{\bullet j}$...	$n_{\bullet k}$	n																																																																																														
x_j	$\frac{h_{1j}}{n_{1\bullet}}$	$\frac{h_{ij}}{n_{i\bullet}}$	$\frac{h_{mj}}{n_{m\bullet}}$																																																																																																	
x_1																																																																																																				
x_2																																																																																																				
\vdots																																																																																																				
x_k																																																																																																				
	1	1	1																																																																																																	
y_i	$\frac{h_{i1}}{n_{\bullet 1}}$	$\frac{h_{ij}}{n_{\bullet j}}$	$\frac{h_{ik}}{n_{\bullet k}}$																																																																																																	
y_1																																																																																																				
y_2																																																																																																				
\vdots																																																																																																				
y_m																																																																																																				
	1	1	1																																																																																																	
																																																																																																				
																																																																																																				


Statistische Unabhängigkeit

Besteht kein rechnerischer Zusammenhang zwischen den Merkmalen in der betrachteten Gesamtheit, so ergeben sich in den Spalten bzw. Zeilen dieselben relativen Häufigkeiten, wenn als Bezugsgröße jeweils die Spalten- bzw. Zeilensumme verwendet wird (bedingte Verteilung). Die absoluten Häufigkeiten in den Tabellenfeldern h_{ij}^e lassen sich dann als normiertes Produkt der Randhäufigkeiten errechnen:

$$h_{ij}^e = \frac{n_{\cdot j} \cdot n_{i\cdot}}{n}$$

Korrelation

Korrelationsrechnung bei ordinalen oder metrischen Merkmalen: Messung der Stärke und Richtung des rechnerischen Zusammenhangs zwischen Merkmalen, der einseitig ($x \rightarrow y$), gegenseitig ($x \longleftrightarrow y$) oder über ein drittes Merkmal (oder einen Merkmalskomplex) ($z \rightarrow (x, y)$) bewirkt sein kann. Die Korrelation ist an der Form der tabellarischen oder grafischen Anordnung erkennbar.



Es wird ab jetzt nicht mehr in den Symbolen zwischen Beobachtungswert und Merkmalsausprägung unterschieden, sondern sowohl die Beobachtungswerte als auch die Merkmalsausprägungen des Merkmals X werden mit x_i bzw. des Merkmals Y mit y_i bezeichnet. Bei $i = 1, \dots, n$ handelt es sich um Beobachtungswerte und bei $i = 1, \dots, m(k)$ um Merkmalsausprägungen.

Auf-

gabe

9

200 erwerbstätige Wähler werden nach der Stellung im Beruf (x_j mit x_1 : Arbeiter, x_2 : Angestellte/Beamte, x_3 : Selbständige) und ihrer Wahlentscheidung bei den letzten Landtagswahlen (y_i mit y_1 : CDU, y_2 : SPD, y_3 : FDP, y_4 : Grüne) befragt. Man erhält folgendes Ergebnis:

	x_1	x_2	x_3
y_1	30	51	9
y_2	44	32	4
y_3	2	11	7
y_4	4	6	—

Berechnen Sie die Randverteilungen, die (sieben) bedingten Verteilungen sowie die absoluten Häufigkeiten der Assoziationstabelle bei statistischer Unabhängigkeit der betrachteten Merkmale in dieser Gesamtheit.

Wie hoch ist der Anteil

- der Angestellten/Beamten, die die SPD wählen?
- der Angestellten/Beamten unter den Wählern der SPD?
- der Wähler der SPD unter den Angestellten/Beamten?

Auf-
gabe

10


In einem Betrieb werden für die letzten zwölf Quartale die Zahl der Arbeitslosen im zugehörigen Arbeitsamtsbezirk (x in Hdt.) und die Zahl der Krankmeldungen (y in Hdt.) verglichen:

x_i	70	80	90	120	130	150	150	170	70	60	60	50
y_i	8	7	10	7	6	4	3	2	13	14	16	18

Zeichnen Sie ein Streudiagramm. Interpretation?

3.2 Maßzahlen des rechnerischen Zusammenhangs

Kenngrößen bivariater Verteilungen, die die Stärke des rechnerischen Zusammenhangs zwischen den beiden Merkmalen in der untersuchten Gesamtheit abbilden, heißen Assoziations- oder Kontingenzmaße (wenn eines der Merkmale nominal skaliert ist) bzw. Korrelationskoeffizienten (wenn keines der Merkmale nominal skaliert ist).

Bezeichn.	Symbol	Berechnung	Skal.-niv.	Aussage
Chi-Quadrat-Koeff.	χ^2	$\chi^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \frac{(h_{ij} - h_{ij}^e)^2}{h_{ij}^e}$	beliebig	Es ist $\chi^2 > 0$, wenn ein Zusammenhang besteht. Eine Richtung des Zusammenhangs ist nicht interpretierbar. Viele Assoziationsmaße beruhen auf der Größe χ^2 , die den Unterschied zwischen den tatsächlichen Häufigkeiten und den bei Unabhängigkeit geltenden Häufigkeiten abbildet.
Pearson's Kontingenzkoeff.	C	$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}}$		
Korrigierter Kontingenzkoeff.	C^*	$C^* = \frac{C}{C_{\max}} \quad \text{mit}$ $C_{\max} = \sqrt{\frac{\min(k, m) - 1}{\min(k, m)}}$		
Kendalls Tau-b	τ_b	$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_c + n_d + T_x)(n_c + n_d + T_y)}}$ bei symmetr. Zusammenhang.	beide Merkmale mindestens ordinal	Paarvergleiche. Anzahl möglicher Paare bei n Einheiten: $\frac{n(n-1)}{2}$. Zahl der konkordanten Paare: n_c , der diskordanten Paare: n_d , Ties (kein Unterschied bzgl. beider Merkmale): $T_x, T_y, (T_{xy})$. $-1 \leq \tau_b, d_y \leq 1$.
Somers' d	d_y	$d_y = \frac{n_c - n_d}{n_c + n_d + T_y} \quad (Y \text{ abh. Variable})$ $d_y = \frac{ad - bc}{(a+c)(b+d)} \quad \text{bei } 2 \times 2\text{-Tabellen.}$		
Korrelationskoeff. von Bravais-Pearson	r (ρ)	$r = \frac{s_{XY}}{s_X \cdot s_Y}$ mit der Kovarianz $s_{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ $= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$	beide Merkmale metrisch	r misst die Stärke des linearen Zusammenhangs. Es gilt: $-1 \leq r \leq 1$. 
Eta-Quadrat-Koeff.	η^2	$\eta^2 = \frac{s_{\text{ext}}^2}{s^2} = 1 - \frac{s_{\text{int}}^2}{s^2}$	beeinflussendes M. beliebig, beeinflusstes M. metrisch	η^2 gibt an, welcher Anteil der Streuung durch die Gruppenzugehörigkeit erklärt werden kann. Es gilt: $0 \leq \eta^2 \leq 1$.

Aufgabe

11

Berechnen Sie für die Aufgaben 7, 9 und 10 sinnvolle Maßzahlen des rechnerischen Zusammenhangs.

Ergänzung: PRE-Maße (Proportional Reduction in Error)

PRE-Maße sollen eine Interpretation der Stärke des Einflusses der unabhängigen auf die abhängige Variable erlauben.

$$PRE = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \quad \text{„proportionale Abnahme des Vorhersagefehlers“}$$

E_1 : „Fehler“ bzgl. der Vorhersage der abhängigen Variablen Y aufgrund ihrer Verteilung.

E_2 : „Fehler“ bzgl. der Vorhersage der abhängigen Variablen Y bei Kenntnis des Einflusses der unabhängigen Variablen X .

Die PRE-Maße unterscheiden sich je nach „Fehler“-Definition und verwendetem Vorhersagewert.

Bezeichnung	Symbol	Berechnung	Skalenniveau	Aussage
Goodmans und Kruskals Lambda	λ_y	$\lambda_y = \frac{\sum_j \max_i h_{ij} - \max_i n_{i.}}{n - \max_i n_{i.}}$ $\lambda_y = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \quad \text{mit}$ $E_1 = n - \max_i n_{i.}$ $E_2 = \sum_j (n_{.j} - \max_i h_{ij})$	beliebig	<p>Man würde den häufigsten Wert vorhersagen, also ist E_1 die Zahl der falschen Voraussagen. Entsprechend E_2: Man würde die häufigsten Werte der bedingten Verteilungen voraussagen, also ist E_2 die Anzahl der falschen Voraussagen.</p> <p>Es gilt: $0 \leq \lambda_y \leq 1$.</p>
Goodmans und Kruskals Gamma	γ	$\gamma = \frac{n_c - n_d}{n_c + n_d} \quad (\text{bei wenig Ties})$ $ \gamma = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \quad \text{mit}$ $E_1 = 0,5 \cdot (n_c + n_d)$ $E_2 = \min(n_c, n_d)$ <p>für $n_c < n_d$: $\gamma < 0$ für $n_c > n_d$: $\gamma > 0$</p>	beide Merkmale mindestens ordinal	<p>Wenn man „nichts“ weiß außer der Zahl Paare mit eindeutiger Reihenfolge, würde man E_1 tippen (Prinzip des unzureichenden Grundes).</p> <p>γ ist größer null, wenn die Zahl der konkordanten Paare überwiegt und γ ist kleiner null, wenn die Zahl der diskordanten Paare überwiegt.</p> <p>Es gilt: $-1 \leq \gamma \leq 1$.</p>
Bestimmtheitsmaß	r^2	$r^2 = \frac{s_{\hat{Y}}^2}{s_Y^2} = 1 - \frac{s_e^2}{s_Y^2}$ $r^2 = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \quad \text{mit}$ $E_1 = s_Y^2, \quad E_2 = s_e^2$	beide Merkmale metrisch	<p>E_1 ist der als Varianz berechnete Prognosefehler, wenn man \bar{y} als Vorhersagewert für jedes y_i verwenden würde. E_2 ist der Prognosefehler, wenn man \hat{y}_i als Vorhersagewert verwendet. Es gilt: $0 \leq r^2 \leq 1$.</p>
Eta-Quadrat-Koeffizient	η^2	$\eta^2 = \frac{s_{\text{ext}}^2}{s^2} = 1 - \frac{s_{\text{int}}^2}{s^2}$ $\eta^2 = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \quad \text{mit}$ $E_1 = s^2, \quad E_2 = s_{\text{int}}^2$	unabh. Merkmal beliebig, abh. Merkmal metrisch	<p>E_1 ist der als Varianz berechnete Prognosefehler, wenn man \bar{y} als Vorhersagewert für jedes y_{ij} verwenden würde. E_2 ist der Prognosefehler, wenn man bei $j = 1, \dots, m$ Untergruppen \bar{y}_j als Vorhersagewert verwendet. Es gilt: $0 \leq \eta^2 \leq 1$.</p>

4 Wahrscheinlichkeitsrechnung

4.1 Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen

Bisher wurden Methoden zur zahlenmäßigen Beschreibung genau abgegrenzter statistischer Massen vorgestellt. Ziel statistischer Untersuchungen ist jedoch meist, allgemeingültigere Ergebnisse zu erhalten. Werden solche Daten als Ergebnisse von Zufallsexperimenten – z.B. Befragungsergebnisse aus einer Zufallsstichprobe von Personen – gewonnen, so ist zwar der Grad der Allgemeingültigkeit des Ergebnisses (der Induktionsschluss) unsicher, er kann aber mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung quantifiziert werden.

Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung (am Beispiel der Aufgabe 9, Seite 13)

1. Eigenschaften des Wahrscheinlichkeitsmaßes (Axiome von Kolmogoroff)		
$P(A) \geq 0$ $P(I) = 1$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	$P(\text{SPD}) = 0,4$ $P(\text{FDP}) = 0,1$ $P(\text{SPD} \cup \text{FDP}) = 0,4 + 0,1 = 0,5$	Die Wahrscheinlichkeit P für ein Ereignis A (Zusammenfassung möglicher Ergebnisse eines Zufallsexperiments) ist nie negativ. Die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis I ist 1. Die Wahrscheinlichkeiten für 2 sich ausschließende Ereignisse können addiert werden.
2. Additionssatz (Verknüpfung \cup : „entweder-oder“, Vereinigung)		
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	$P(\text{SPD} \cup \text{Arbeiter}) = 0,4 + 0,4 - 0,22 = 0,58$	Schließen sich zwei Ereignisse nicht aus, so muss von der Summe der Wahrscheinlichkeiten für die Einzelergebnisse die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge abgezogen werden.
3. Multiplikationssatz (Verknüpfung \cap : „sowohl-als-auch“, Schnitt)		
$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B A) = P(B) \cdot P(A B)$ $P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	$P(\text{SPD} \cap \text{Selbstg.}) = 0,4 \cdot 0,05 = 0,02$ $= 0,1 \cdot 0,2 = 0,02$	Bei (stochastischer) Unabhängigkeit zweier Ereignisse gilt: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ $P(A B) = P(A)$


Praktische Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

- Bei einfachen Zufallsexperimenten, deren Ergebnisse (Elementarereignisse) gleichwahrscheinlich sind, lassen sich Wahrscheinlichkeiten aus dem Verhältnis von „günstigen“ zu „möglichen“ Fällen berechnen (Glücksspiele, Urnenmodelle). Die diesem Wahrscheinlichkeitsmaß zugrundeliegende Auffassung wird auch **klassischer** Wahrscheinlichkeitsbegriff genannt.
- In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird beim „Schätzen“ und „Testen“ (vgl. Abschnitt 5.1) zumeist vom **statistischen** oder **frequentistischen** Wahrscheinlichkeitsbegriff ausgegangen: Wahrscheinlichkeit ist eine relative Häufigkeit, die in einer sehr langen Reihe unabhängiger Versuche festgestellt wurde. Der allgemeine Ursachenkomplex für die Häufigkeitsverteilung muss allerdings konstant bleiben. Beispielsweise könnte man so eine Verteilung von möglichen Ergebnissen einer Stichprobenziehung errechnen und aus dieser Verteilung dann Wahrscheinlichkeiten für ganz bestimmte Ergebnisse entnehmen.
- Insbesondere bei ökonomischen Anwendungen (z.B. bei Risikoabschätzungen in Entscheidungssituationen) spielt der induktive, speziell der **subjektive** Wahrscheinlichkeitsbegriff eine Rolle. Die

Wahrscheinlichkeit wird als ein Maß für den Grad der Überzeugtheit von der Richtigkeit einer Aussage aufgefasst. Vielfach wird die Meinung vertreten, dass in praktischen Anwendungen jede Wahrscheinlichkeitsaussage subjektive Elemente enthalte.

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Drückt man die möglichen Ergebnisse als Zufallsvariable X aus, d.h. als eine Abbildung, die jedem Ergebnis aus der Ergebnismenge eine reelle Zahl zuordnet, so könnte man in allen drei genannten Fällen eine Verteilung von Wahrscheinlichkeiten auf die Zufallsvariable X als Funktionsgleichung erstellen. Die Funktion $F(x)$, die jedem $x \in \mathbb{R}$ die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq x)$ zuordnet, also $F(x) = P(X \leq x)$, heißt Verteilungsfunktion von X . Die Wahrscheinlichkeiten für mögliche Realisationen x kann man dann an der Verteilungsfunktion $F(x)$ ablesen. Für die praktische Anwendung üblich sind häufig verwendete Wahrscheinlichkeits- bzw. Verteilungsfunktionen, die schon tabellarisch (in „Tafeln“) ausgewertet sind.



- In der Praxis wird zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten oft so vorgegangen, dass je nach Art der Zufallsvariablen und des die Wahrscheinlichkeit erzeugenden Zufallsprozesses aus vorliegenden „theoretischen“ Verteilungen, das sind in mathematische Modelle – hier Funktionsgleichungen – abgebildete, theoretische Zufallsprozesse, eine „passende“ ausgewählt wird. Eine so zustandekommende Wahrscheinlichkeitsaussage ist dann natürlich selbst mit einer gewissen Unsicherheit (nämlich die der richtigen Modellauswahl) behaftet, ohne dass diese Unsicherheit quantifiziert werden könnte.
- Für derartige Verteilungen lassen sich normalerweise Kenngrößen wie in der deskriptiven Statistik (Erwartungswert, Varianz) berechnen. Günstig ist es, wenn diese Kenngrößen auch eine Funktion der Parameter der Verteilung sind. Beispielsweise sind bei der Gauß'schen Normalverteilung die Kenngrößen μ und σ^2 selbst Parameter der Verteilung (vgl. Abschnitt 4.2).

Aufgabe

12

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Ereignis „Zahl der Arbeiter“ in einer Stichprobe m.Z. von 3 Personen aus den 200 der Aufgabe 9, Seite 13.
- Angenommen, wir ziehen aus der Einkommensverteilung von Aufgabe 3, Seite 6, eine Stichprobe vom Umfang $n = 1$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu ziehen, dessen Einkommen weniger als 1 000 €, 2 000 € und mehr, zwischen 1 250 € und unter 3 000 € beträgt?




4.2 Die Normalverteilung als Stichprobenverteilung

Die am häufigsten eingesetzte theoretische Verteilung ist die Gauß'sche Normalverteilung. Die Zufallsvariable kann hier als Summe „sehr vieler“ voneinander unabhängiger Einflussvariablen interpretiert werden, also z.B. als arithmetisches Mittel bei der Ziehung von einfachen, unabhängigen Zufallsstichproben. Die Normalverteilung ist dann die Verteilung aller möglichen Ziehungsergebnisse.

Die Parameter der Normalverteilung sind die (auch deshalb schon in der deskriptiven Statistik häufig verwendeten) Größen μ und σ^2 . Für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ gilt:

$$P(X \leq x) = F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{u-\mu}{\sigma}\right)^2} du.$$

In der Praxis bestimmt man diese Wahrscheinlichkeit bei bekannten μ und σ so, dass man die Differenz $x - \mu$ als Vielfaches z von σ ausdrückt, also $x = \mu + z \cdot \sigma$ bzw. $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ berechnet. Die zu z gehörende Wahrscheinlichkeit kann in [Tafeln zur Standardnormalverteilung](#) abgelesen werden.

$P(Z \leq z_1) = \Phi(z_1)$				$P(Z \leq -z_1) = \Phi(-z_1) = 1 - \Phi(z_1)$				$P(-z_1 \leq Z \leq z_1) = 2\Phi(z_1) - 1$			
											
z	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
$\Phi(z)$	0,500	0,5987	0,6915	0,7734	0,8413	0,8944	0,9332	0,9599	0,9772	0,9938	0,9987

Bei der Ziehung unabhängiger Zufallsstichproben vom Umfang n aus einer **beliebigen** Grundgesamtheit mit arithmetischem Mittel μ und Standardabweichung σ gilt für die Verteilung aller möglichen arithmetischen Mittel:

- Der Erwartungswert („Durchschnitt“) aller möglichen Stichprobenergebnisse für das arithmetische Mittel ist das arithmetische Mittel der Grundgesamtheit, d.h. $E(\bar{X}) = \mu$.
- Die Streuung aller möglichen Durchschnitte hängt von der Streuung in der Grundgesamtheit und dem Stichprobenumfang ab, d.h. $E(\bar{X} - \mu)^2 = \text{Var}(\bar{X}) = \sigma_x^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ (bzw. $\frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{\sigma^2}{n}$ ohne Zurücklegen; für N gegenüber n genügend groß kann der Korrekturfaktor $(N-n)/(N-1)$ vernachlässigt werden).
- Bei „großen“ (Praxis: $n > 100$) Stichprobenumfängen kann die Verteilung der Stichprobenergebnisse durch eine Normalverteilung mit den Parametern μ und $\sigma_x^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ approximiert werden (zentraler Grenzwertsatz, vgl. Beispiel mit Microsoft Excel www.prof-roessler.de/Dateien/Statistik/zgs.xlsm).

**Auf-
gabe**

13

Angenommen, die Körpergröße von Männern in Deutschland sei normalverteilt mit $\mu = 178\text{cm}$ und $\sigma = 10\text{cm}$.

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei zufälliger Auswahl eines Mannes, eine Körpergröße aa) $x \leq 193\text{cm}$ ab) $x > 168\text{cm}$ ac) $158\text{cm} < x \leq 198\text{cm}$ zu erhalten?
- Angenommen, man ziehe eine Stichprobe mit Zurücklegen vom Umfang $n = 100$ (1000). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, als arithmetisches Mittel einen Wert ba) $\bar{x} > 177\text{cm}$ bb) $\bar{x} \leq 180\text{cm}$ bc) $175\text{cm} < \bar{x} \leq 181\text{cm}$ zu erhalten?

Häufig angewandte Stichprobenverteilungen und ihre Parameter

Zufallsvariable	Stichprobenverteilung und Verteilungsvoraussetzungen	Parameter
\bar{X}	$N(\mu, \sigma^2)$ für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ oder $n > 30$: X bel. verteilt	$E(\bar{X}) = \mu$ $Var(\bar{X}) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ (m.Z.) $Var(\bar{X}) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (o.Z.) für $\frac{n}{N} < 0,05$ kann $\frac{N-n}{N-1}$ vernachlässigt werden.
P	$B(n\pi n, \pi)$ (m.Z.) $N(n\pi, n\pi(1-\pi))$ für $n\pi(1-\pi) \geq 9$	$E(P) = \pi$ $Var(P) = \frac{\pi(1-\pi)}{n}$ (m.Z.)
$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$	$N(0, 1)$ für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$E\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}\right) = 0$ $Var\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}\right) = 1$
$\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$	$t(n-1)$ für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $N(0, 1)$ für $n > 30$: X bel. verteilt	$v = n - 1$
$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\chi^2(n-1)$ für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$v = n - 1$
$\frac{S_1^2}{S_2^2}$	$f(n_1 - 1, n_2 - 1)$ für $X_g \sim N(\mu_g, \sigma_g^2)$ $g = 1, 2$	$v_1 = n_1 - 1, v_2 = n_2 - 1$
$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$	$N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2)$ für $X_g \sim N(\mu_g, \sigma_g^2)$ oder $n > 30$: X_g bel. verteilt $g = 1, 2$	$E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2$ $Var(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$ (m.Z. bzw. o.Z. für $\frac{n_g}{N_g} < 0,05, g = 1, 2$)
$P_1 - P_2$	$N(n_1\pi_1 - n_2\pi_2, n_1\pi_1(1-\pi_1) + n_2\pi_2(1-\pi_2))$ für $n_g\pi_g(1-\pi_g) \geq 9$ $g = 1, 2$	$E(P_1 - P_2) = \pi_1 - \pi_2$ $Var(P_1 - P_2) = \frac{\pi_1(1-\pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1-\pi_2)}{n_2}$ (m.Z. bzw. o.Z. für $\frac{n_g}{N_g} < 0,05, g = 1, 2$)

5 Induktive Statistik

5.1 Grundlagen des Schätzens und Testens

Ist die Verteilung möglicher Stichprobenergebnisse bekannt – also z.B. eine bestimmte *theoretische Verteilung* oder eine durch Simulationsstudien näherungsweise abgeleitete Verteilung – so können schon vor einer speziellen Stichprobenziehung Wahrscheinlichkeitsaussagen zu erwarteten Ergebnissen getroffen (*Inklusionsschluss*) oder ein notwendiger Stichprobenumfang, der eine „Mindestgenauigkeit“ gewährleistet, bestimmt werden. Auch könnten von einem gegebenen Stichprobenergebnis aus quantifizierte Mutmaßungen über den „wahren“ Wert in der Grundgesamtheit angestellt werden (*Repräsentationsschluss*). Ist die Stichprobenverteilung die Normalverteilung $N(\mu, \sigma_{\bar{x}}^2)$, so lässt sich die Vorgehensweise für z.B. symmetrische Intervalle wie folgt veranschaulichen.

Inklusionsschluss	Repräsentationsschluss
$P(\mu - z \cdot \sigma_{\bar{x}} \leq \bar{X} \leq \mu + z \cdot \sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$ <p>ca. 95% der \bar{x}_i liegen im Bereich $\pm 2 \cdot \sigma_{\bar{x}}$ um μ</p>	$P(\bar{X} - z \cdot \sigma_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{X} + z \cdot \sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$ <p>ca. 95% der Intervalle der Länge $\pm 2 \cdot \sigma_{\bar{x}}$ um die \bar{x}_i überdecken den Wert μ – „Vertrauensintervalle“</p>

Die Größe $|e| = z \cdot \sigma_{\bar{x}}$ ist der sog. Stichprobenfehler. Sind e , z und σ gegeben, so kann ein „notwendiger“ Stichprobenumfang berechnet werden: $n \geq z^2 \cdot \frac{\sigma^2}{e^2}$.

- Beim **Repräsentationsschluss** wird bei vorgegebenem z und $\sigma_{\bar{x}}$ ein Intervall berechnet, das mit einer Wahrscheinlichkeit von $(1 - \alpha)$ den unbekannten Wert μ überdeckt. σ ist jedoch meist unbekannt und wird dann aus der Stichprobe geschätzt: $\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ (weil $E(s^2) = \sigma^2$, d.h. s^2 erwartungstreue Schätzfunktion für σ^2 . (N groß: kein Korrekturfaktor, n groß: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$.)
- Beim **Hypothesentest** wird überprüft, ob ein bestimmtes Stichprobenergebnis zu den (nach dem **Inklusionsschluss**) wahrscheinlichen Ergebnissen gehört. Wenn nicht, gilt die Hypothese als widerlegt.
- Beim **Rückschluss** von einem bestimmten „repräsentativen“ Stichprobenergebnis auf die unbekannte Grundgesamtheit – die übliche Anwendung in der Markt- und Meinungsforschung – wird die Güte des Ergebnisses durch die Angabe eines **Vertrauensintervalls** (Repräsentationsschluss), des Stichprobenfehlers oder wenigstens des Stichprobenumfangs dokumentiert.
- Ist X eine **0,1-Variable** und p (bzw. π) der Anteil der 1-Träger in der Stichprobe (Grundgesamtheit), so ist $\bar{x} = p$ (bzw. $\mu = \pi$) und $s^2 = \frac{n}{n-1} p(1-p)$ (bzw. $\sigma^2 = \pi(1-\pi)$).

Auf-
gabe

14

- Es wird behauptet, deutsche Männer seien im Durchschnitt 178cm groß bei einer Standardabweichung von 10cm. Wir überprüfen die Behauptung durch Zufallsstichproben vom Umfang $n = 100$ (1000) und erhalten jeweils $\bar{x} = 179$. Ist die Behauptung bei einer Wahrscheinlichkeit von $(1 - \alpha) = 0,9545$ haltbar (also bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $\alpha = 0,0455$ widerlegbar)?
- Durch eine einfache Zufallsstichprobe von 900 Haushalten aus den ca 39 Mio. Haushalten in Deutschland sollen die Durchschnittsausgaben für Nachrichtenübermittlung erfasst werden. Wir erhalten $\sum_{i=1}^{900} x_i = 45000$ und $\sum_{i=1}^{900} x_i^2 = 9531900$. Wie „genau“ ist das Ergebnis?

5.2 Schätzverfahren

Der Repräsentationsschluss ist ein Rückschluss vom eingetroffenen Stichprobenergebnis auf den unbekannten, aber festen Parameter in der Grundgesamtheit. Da nach der Realisation keine Wahrscheinlichkeitsaussagen mehr möglich sind, spricht man in frequentistischer Betrachtungsweise von einer Konfidenzaussage: Die bzgl. des Stichprobenfehlers getroffene Aussage (das Intervall) wäre bei einer großen Zahl unabhängiger Stichprobenziehungen in z.B. 95,45% (Konfidenzniveau) der Fälle richtig. Als interessierende Ergebnisse aus Zufallsstichproben werden hier arithmetische Mittel bzw. Merkmalssummen betrachtet. Bei gegebenem Konfidenzniveau – also gegebenem z , sofern die Gauß'sche Normalverteilung als Stichprobenverteilung verwendet werden darf, – hängt der Stichprobenfehler von der Streuung der möglichen Stichprobenergebnisse, also hier von der Standardabweichung $\sigma_{\bar{x}}$ ab, die in der Praxis geschätzt werden muss.

Einfache Zufallsstichproben

Bei einfachen Zufallsstichproben (simple random sampling) hat vor der ersten zufälligen Auswahl jede Einheit in der Grundgesamtheit dieselbe Auswahlwahrscheinlichkeit. Es kann mit (m.Z.) oder ohne (o.Z.) Zurücklegen gezogen werden.

Vorgehensweise	m.Z.	o.Z.
1. Genauigkeitsvorgabe, d.h. gewünschte Genauigkeit entweder absolut (e') oder relativ ($e'_r = \frac{e'}{\mu'}$) bei vermutetem μ'		
2. Abschätzung der Varianz (aus anderen, z.B. früheren Erhebungen, Pilotstudien, „Annahmen“ bzw. der Stichprobenrealisation selbst)	σ'^2	σ'^2
3. Bestimmung des notwendigen Stichprobenumfangs n $\left[\frac{N-n}{N-1} \approx 1 - \frac{n}{N} \text{ mit } \frac{n}{N} : \text{„Auswahlsatz“} \right]$	$n \geq z^2 \frac{\sigma'^2}{e'^2}$ $n \geq z^2 \frac{V'^2}{e_r'^2}$	$n \geq N \left(1 + \frac{N e'^2}{z^2 \sigma'^2} \right)^{-1}$ $n \geq N \left(1 + \frac{N e_r'^2}{z^2 V'^2} \right)^{-1}$
4. Zufallsauswahl (vollständige Auswahlliste!) und Erhebung x_i		
5. Hochrechnung	$\hat{\mu} = \bar{x}$	$\hat{\mu} = \bar{x}$
6. Fehlerrechnung \hat{e}	$ \hat{e} = z \frac{s}{\sqrt{n}}$	$ \hat{e} = z \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}$
7. Konfidenzintervalle	$\bar{x} - \hat{e} \leq \mu \leq \bar{x} + \hat{e} $ $N \cdot \bar{x} - N \cdot \hat{e} \leq N \cdot \mu \leq N \cdot \bar{x} + N \cdot \hat{e} $	

Geschichtete Zufallsstichproben

Um die Streuung der möglichen Ergebnisse zu verringern, versucht man in der Praxis durch Nutzung von Zusatzinformationen die Gesamtheit in – bezüglich der Varianz des zu erhebenden (bzw. eines mit ihm hoch korrelierten) Merkmals – homogene Untergruppen zu schichten (stratified sampling). Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Schichten und die Schichtgrenzen schon festgelegt sind, die Gesamtstichprobe n proportional zu den Schichtumfängen N_h der L Schichten ($h = 1, \dots, L$) aufgeteilt wird und die Stichproben je Schicht n_h m.Z. ausgewählt werden. ($\sum n_h = n$, $\sum N_h = N$)

Vorgehensweise	
1. Genauigkeitsvorgabe $ e' = z \cdot \sigma_{\bar{x}} = z \cdot \frac{1}{N} \cdot \sqrt{\sum N_h^2 \frac{\sigma_h^2}{n_h}} = z \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum \frac{N_h}{N} \sigma_h^2}$ mit $n_h = \frac{N_h}{N} \cdot n$	
2. Abschätzung der Varianzen	$\sigma_h'^2$
3. Notwendiger Stichprobenumfang n (bei proportionaler Aufteilung)	$n \geq z^2 \cdot \frac{\sum N_h \sigma_h'^2}{N \cdot e'^2}, \quad \sigma_h'^2 \text{ geschätzt}$ $e' \text{ vorgegeben}$
4. Proportionale Aufteilung	$n_h = \frac{N_h}{N} \cdot n$
5. Zufallsauswahl m.Z. je Schicht und Berechnung \bar{x}_h	
6. Hochrechnung	$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum N_h \bar{x}_h$
7. Fehlerrechnung \hat{e}	$ \hat{e} = z \cdot \frac{1}{N} \sqrt{\sum N_h^2 \frac{s_h^2}{n_h}} = z \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \sum \frac{N_h}{N} s_h^2}$
8. Konfidenzintervalle	$\bar{x} - \hat{e} \leq \mu \leq \bar{x} + \hat{e} $ $N \cdot \bar{x} - N \cdot \hat{e} \leq N \cdot \mu \leq N \cdot \bar{x} + N \cdot \hat{e} $

**Auf-
gabe**

15

Aus einer früheren Erhebung zu den monatlichen Ausgaben für ein Kind hat man für eine Grundgesamtheit von Haushalten mit Kindergeldansprüchen folgende Daten:

Schicht Nr.	Anzahl der Haushalte (Mio)	Gesamtausgaben je Schicht (Mio €)	Summe der quadrierten Einzelausgaben je Schicht (Mio € ²)
1	5	750	125 000
2	3	900	280 800
3	2	1 000	512 800

Man berechne für eine geplante neue Erhebung der Durchschnittsausgaben den notwendigen Stichprobenumfang bei uneingeschränkter und bei geschichteter Zufallsauswahl (Aussagewahrscheinlichkeit 95,45%, zulässiger absoluter Zufallsfehler 5,- €).


Häufig angewandte Konfidenzintervalle

Parameter	Konfidenzintervall	Verteilung
μ bei bekanntem σ	$\bar{x} - z \cdot \sigma_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + z \cdot \sigma_{\bar{x}}$ <p>mit $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (m.Z.)</p> $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ (o.Z.)*	$N(\mu, \sigma^2)$ für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ oder $n > 30$: X bel. verteilt
μ bei unbekanntem σ	$\bar{x} - t \cdot \hat{\sigma}_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + t \cdot \hat{\sigma}_{\bar{x}}$ $\bar{x} - z \cdot \hat{\sigma}_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + z \cdot \hat{\sigma}_{\bar{x}}$ <p>mit $\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ (m.Z.)</p> $\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ (o.Z.)*	$t(n-1)$ für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $N(\mu, \sigma^2)$ für $n > 30$: X bel. verteilt * für $\frac{n}{N} < 0,05$ kann $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ vernachlässigt werden.
σ^2	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$	$\chi^2(n-1)$ für $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ normalverteilt für $n > 30$ und $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
π	$p - z \cdot \hat{\sigma}_p \leq \pi \leq p + z \cdot \hat{\sigma}_p$ <p>mit $\hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n-1}}$ (m.Z.)</p> $\hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n-1}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ (o.Z.)*	$N(n\pi, n\pi(1-\pi))$ für $np(1-p) \geq 9$
$\mu_1 - \mu_2$	$(x_1 - x_2) - t \hat{\sigma}_D \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (x_1 - x_2) + t \hat{\sigma}_D$ <p>mit $\hat{\sigma}_D = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$</p> <p>(m.Z. bzw. o.Z. für $\frac{n_g}{N_g} < 0,05$, $g = 1, 2$)</p> <p>wobei: $s_g^2 = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{i=1}^{n_g} (x_i - \bar{x})^2$, $g = 1, 2$</p> $= \frac{1}{n_g - 1} \sum_{i=1}^{n_g} x_i^2 - \frac{n_g}{n_g - 1} \cdot \bar{x}^2$	$t(v) \text{ mit } v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{\frac{n_1}{n_1-1}} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{n_2}{n_2-1}}}$ <p>für $X_g \sim N(\mu_g, \sigma_g^2)$ $N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2)$ für $n > 30$: X_g bel. verteilt, $g = 1, 2$</p>
$\pi_1 - \pi_2$	$(p_1 - p_2) - z \hat{\sigma}_D \leq \pi_1 - \pi_2 \leq (p_1 - p_2) + z \hat{\sigma}_D$ <p>mit $\hat{\sigma}_D = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1-1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2-1}}$</p> <p>(m.Z. bzw. o.Z. für $\frac{n_g}{N_g} < 0,05$, $g = 1, 2$)</p>	$N(\mu, \sigma^2)$ mit $\mu = n_1\pi_1 - n_2\pi_2$, $\sigma^2 = n_1\pi_1(1-\pi_1) + n_2\pi_2(1-\pi_2)$ für $n_g p_g(1-p_g) \geq 9$, $g = 1, 2$

5.3 Testverfahren


Die sog. **Nullhypothese** (H_0) ist die mathematische Formulierung einer aus der Theorie oder Erfahrung oder Güteforderung etc. sich ergebenden Hypothese so, dass eine Überprüfung durch einen statistischen Test möglich ist. Dazu gehören eine adäquate empirische Messung und deren Umsetzung in eine statistische Kenngröße (**Testfunktion** T als Zufallsvariable) so, dass bei bekanntem Zufallsprozess eine Verteilung möglicher Ergebnisse angegeben werden kann. So lassen sich Regeln ableiten, die mögliche Stichprobenergebnisse als mit einer Hypothese verträglich oder nicht verträglich einzuordnen erlauben.

Signifikanztest



Zur Entscheidung, ob eine Hypothese vorläufig aufrechterhalten werden kann oder durch eine Stichprobe als widerlegt gilt, wird eine Verteilung der möglichen Ergebnisse t einer Testfunktion betrachtet, die sich bei wahrer Hypothese ergeben hätte $[f(t|H_0)]$. Ist das eingetroffene Ergebnis als „unwahrscheinlich“ einzustufen, so gilt die Hypothese als widerlegt. Je unwahrscheinlicher das Ergebnis wäre, d.h. je stärker die Widerlegung ausfällt, desto höher ist die **Signifikanz**.

Beispiel: Aufgabe 14, Seite 20: Stichprobenergebnisse \bar{x}_i . Sind Männer größer als 178cm oder nicht?
 $\mu_0 = 178$, $\sigma = 10$, $\alpha = 0,0446$, $T = \bar{X}$, $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 178$, $f(t|H_0) = N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$



Hinweis zur Interpretation

Ein Ergebnis, das „signifikant“ oder gar „hochsignifikant“ ist (vgl. „**pur**er“ Signifikanztest, Seite 25), bedeutet nun nicht, dass es in der Sache wesentlich sei, sondern nur, dass der Verfahrenseinfluss vermutlich gering ist. Dies kann einfach z.B. durch einen großen Stichprobenumfang erreicht werden. Nichtsignifikanz, also kein Widerspruch zur Hypothese, bedeutet ebenso wenig, dass die Hypothese sachlich gerechtfertigt oder gar bestätigt wurde – sie wurde nur nicht mit der gewählten Verfahrensweise widerlegt.

Fehlermöglichkeiten bei Tests

Bei der geschilderten Vorgehensweise der Hypothesenprüfung – nämlich sehr unwahrscheinliche Ergebnisse (am Rand der Testverteilung) als Widerlegung aufzufassen –, geht man natürlich das Risiko ein, fälschlicherweise zu widerlegen. Das Risikomaß hierfür ist die **Irrtumswahrscheinlichkeit** α , d.h. der Anteil all derjenigen Ergebnisse für t , die man als unwahrscheinlich bezeichnen würde.



Testentscheidung	tatsächlicher Zustand	
	H_0 richtig	H_0 falsch
H_0 nicht verworfen	richtige Entscheidung (Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$)	Fehler 2. Art (Wahrscheinlichkeit β)
H_0 verworfen	Fehler 1. Art (Wahrscheinlichkeit α)	richtige Entscheidung (Wahrscheinlichkeit $1 - \beta$)

α wird beim klassischen Signifikanztest vorgegeben. Bei gegebener Testfunktion und ihrer Verteilung ist damit der Ablehnungsbereich für H_0 festgelegt. Manchmal wird erst nach der Stichprobenauswertung ein α berechnet, zu dem H_0 gerade noch nicht verworfen wird („purer“ Signifikanztest). Je geringer dann α ausfällt, desto stärker ist die Widerlegung von H_0 , d.h. desto höher ist die Signifikanz.



β hängt von einer Alternativhypothese H_1 ab, die in wissenschaftlichen Anwendungen selten als Punkthypothese (klassischer Alternativtest) formulierbar ist. $(1 - \beta)$ wird als „Macht“ – β als „Operationscharakteristik“ – eines Tests bezeichnet und gilt als Auswahlkriterium: Hat man bei vorgegebenem α die Wahl zwischen verschiedenen Testverfahren, so wird man jenes mit der größten Macht wählen.

Beispiel: Aufgabe 14, Seite 20: $\mu_0 = 178$, $\sigma = 10$, $\alpha = 0,0446$, $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 178 \Rightarrow z = 1,7$



$n = 100$: $\sigma_{\bar{x}} = 1$, $c = 179,7$
 $H_1 : \mu \geq \mu_1 = 180$: $\beta = 0,3821$



$n = 200$: $\sigma_{\bar{x}} = 0,707$, $c = 179,2$
 $H_1 : \mu \geq \mu_1 = 180$: $\beta = 0,1292$




$n = 400$: $\sigma_{\bar{x}} = 0,5$, $c = 178,85$
 $H_1 : \mu \geq \mu_1 = 180$: $\beta = 0,0107$



Praktische Vorgehensweise beim klassischen Signifikanztest

Eine Testentscheidung bzw. die Angabe eines Signifikanzniveaus wird getroffen auf der Grundlage einer Testverteilung bei Gültigkeit der Nullhypothese. Widerlegt man die H_0 , dann wäre auch die Testverteilung und damit die so berechnete Irrtumswahrscheinlichkeit α falsch. Man wird deshalb die zu prüfende Hypothese bei einer Bereichshypothese als Bereichsgegenhypothese H_1 bzw. bei einer Punkthypothese als Bereichsgegenhypothese H_1 und H_2 formulieren. Die Irrtumswahrscheinlichkeit erreicht dann höchstens α , auch wenn H_0 nicht zutrifft.



Da H_0 also nie bestätigt, sondern höchstens nicht widerlegt werden kann, bedeutet damit eine Widerlegung von H_0 indirekt eine Bestätigung (und nicht nur Nicht-Widerlegung) von H_1 .

Schritte	Beispiel 1	Beispiel 2
1. Formulierung von H_0	$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$	$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ $H_1 : \mu_1 > \mu_2$
2. Wahl der Testfunktion und Bestimmung der Testverteilung bei Gültigkeit von H_0	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$ $\sim N(0, 1)$	$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\sim N(0, 1)$
3. Wahl von α und Bestimmung des Ablehnungsbereichs	$z_{1-\alpha}$	$z_{1-\alpha}$ für $n_1 + n_2 - 2 > 30$
4. Stichprobenziehung und Berechnung von t		
5. Testentscheidung, d.h. Widerlegung von H_0 bei	$t > z_{1-\alpha}$	$t > z_{1-\alpha}$
Für weitere Tests vgl. „Häufig angewandte Testverfahren“.		

Aufgabe

16

Deutsche Männer sind im Durchschnitt 178cm groß bei einer Streuung von $\sigma = 10$ cm. 10% sind blond. Eine Stichprobe von 100 Managern in höheren Positionen ergab eine durchschnittliche Körpergröße von $\bar{x} = 175$ cm. 13 Manager waren blond. Prüfen Sie bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $\alpha = 0,0446$

- die „Napoleon“-Hypothese: Im Beruf erfolgreiche Männer sind im Durchschnitt kleiner als andere,
- die „Teutonen“-Hypothese: Unter den im Beruf erfolgreichen Männern gibt es mehr Blonde.

Häufig angewandte Testverfahren, α vorgegeben



(Hypothetische) Frage, die durch das Verfahren beantwortet werden soll	Zu vergleichende statistische Kenngrößen (Verteilungsvoraussetzung)	Nullhypothese H_0	Testfunktion T	Testverteilung T/H_0	Entscheidungsregel zur Ablehnung von H_0 bei gegebenem α , z.B. $\alpha = 0,05$
Kann eine Stichprobe gemessen am arithmetischen Mittel aus einer bestimmten Grundgesamtheit stammen?	\bar{X} und μ_0 bei bekanntem σ ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$)	$H_0: \mu = \mu_0$ ($H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_0: \mu \geq \mu_0$)	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$N(0, 1)$	$ t > z_{1-\alpha/2}$ ($t > z_{1-\alpha}$ $t < -z_{1-\alpha}$)
	\bar{X} und μ_0 bei unbekanntem σ ($n \leq 30: X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $n > 30: X$ bel. vert.)	$H_0: \mu = \mu_0$ ($H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_0: \mu \geq \mu_0$)	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$	$t(n-1)$ bei $n > 30$ $N(0, 1)$	$ t > t_{1-\alpha/2}$ $ t > z_{1-\alpha/2}$ ($t > t_{1-\alpha}, t > z_{1-\alpha}$ $t < -t_{1-\alpha}, t < -z_{1-\alpha}$)
Unterscheiden sich zwei Stichproben oder stammen sie aus derselben Grundgesamtheit? ($g = 1, 2$)	\bar{X}_1 und \bar{X}_2 mit $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 =: \sigma^2$, aber unbekannt ($n_g \leq 30: X_g \sim N(\mu_g, \sigma_g^2)$ $n_g > 30: X_g$ bel. vert.)	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ ($H_0: \mu_1 \leq \mu_2$ $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$)	$\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\hat{\sigma}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$t(n_1 + n_2 - 2)$ bei $n_1, n_2 > 30$ $N(0, 1)$	$ t > t_{1-\alpha/2}$ $ t > z_{1-\alpha/2}$ ($t > t_{1-\alpha}, t > z_{1-\alpha}$ $t < -t_{1-\alpha}, t < -z_{1-\alpha}$)
Unterscheiden sich mindestens zwei Stichproben beim Vergleich von r Stichproben? ($g = 1, \dots, r$)	$\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_r$ mit $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_r^2$, aber unbekannt ($X_g \sim N(\mu_g, \sigma_g^2)$)	$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r$	$\frac{\frac{S_{\text{ext}}^2}{r-1}}{\frac{S_{\text{int}}^2}{n-r}} = \frac{\sum_{g=1}^r n_g (\bar{X}_g - \bar{X})^2}{r-1} \bigg/ \frac{\sum_{g=1}^r \sum_{i=1}^{n_g} (X_{gi} - \bar{X}_g)^2}{n-r}$	$f(r-1, n-r)$ mit $n = \sum_{g=1}^r n_g$	$t > f_{1-\alpha}$
Kann eine Stichprobe gemessen an der Varianz aus einer beliebigen Grundgesamtheit stammen?	S^2 und σ_0^2 mit μ unbekannt ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$)	$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$	$t > \chi_{1-\alpha}^2$
Unterscheiden sich zwei Stichproben bezüglich der Varianz?	S_1^2 und S_2^2 ($X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$)	$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\frac{S_1^2}{S_2^2}$	$f(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$t > f_{1-\alpha}$
Sind zwei Merkmale statistisch verbunden?	h_{ij} und h_{ij}^e in einer Kreuztabelle mit m Zeilen und k Spalten	$H_0: \pi_{ij} = \pi_{ij}^e$	$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \frac{(h_{ij} - h_{ij}^e)^2}{h_{ij}^e}$	$\chi^2([m-1][k-1])$	$t > \chi_{1-\alpha}^2$ (h_{ij}^e sollte größer als 5 sein)

6 Wirtschaftsstatistische Anwendungen

6.1 Disparitätsmessungen

Die Verteilung der Merkmalssumme (nicht-negativer metrischer Merkmale) auf die Merkmalsträger ist Gegenstand der Konzentrations- und Disparitätsmessung. „Konzentration“ bedeutet, dass auf wenige (große) Merkmalsträger ein großer Teil der Merkmalssumme entfällt (absolute Konzentration), „Disparität“ bedeutet, dass auf einen kleinen Anteil der Merkmalsträger ein großer Teil der Merkmalssumme entfällt (relative Konzentration). Volkswirtschaftliche Disparitätsmessungen betreffen Merkmale wie Einkommen und Vermögen von Haushalten, betriebswirtschaftliche Disparitätsmessungen („ABC-Analysen“) werden bei Auftragswerten, Umsätzen, Deckungsbeiträgen von Produkten etc. vorgenommen. Bei großen n erlauben Lorenzkurven übersichtliche Darstellungen.

	Beobachtungswerte	Gruppierte Verteilung	Klassierte Verteilung
Bezugsgröße jeweils der Größe nach geordnet	x_i $i = (1), \dots, (n)$	x_i (Merkmalsauspr.) $i = 1, \dots, m$	$[a_j, b_j)$ $j = 1, \dots, m$
relative Häufigkeit	$f_i = \frac{1}{n}$	f_i	f_j
kumulierte relative Häufigkeit	$F_i = \frac{(i)}{n}$	$F_i = \sum_{k=1}^i f_k$	$F_j = \sum_{k=1}^j f_k$
relative Merkmals-summe	$l_i = \frac{x(i)}{\sum_{i=1}^n x_i}$	$l_i = \frac{h_i x_i}{\sum_{i=1}^m h_i x_i} = \frac{f_i x_i}{\bar{x}}$	$l_j = \frac{h_j \bar{x}_j}{\sum_{j=1}^m h_j \bar{x}_j} = \frac{f_j \bar{x}_j}{\bar{x}}$
kumulierte relative Merkmalssumme	$L_i = \sum_{k=1}^i l_k$	$L_i = \sum_{k=1}^i l_k$	$L_j = \sum_{k=1}^j l_k$

Bei n klein	 <p>A: $f_i \ll l_i$ B: $f_i \approx l_i$ C: $f_i \gg l_i$</p>	Bei n groß: Lorenzkurve	 <p>A: $\frac{dL}{dF} \gg 1$ B: $\frac{dL}{dF} \approx 1$ C: $\frac{dL}{dF} \ll 1$</p>
---------------	--	---------------------------	---

Aufgabe

17

€ von... bis unter ...	Ford.-Zahl	Gesamtwert in Tsd €
0 – 20	1.200	20
20 – 40	800	20
40 – 100	1.000	60
100 – 800	600	200
800 – 1.500	200	200
1.500 – 4.000	80	200
4.000 – 6.000	80	400
6.000 und mehr	40	900

Der Forderungsbestand eines Unternehmens zeigte am 31.12. nebenstehende Struktur.

Führen Sie mit Hilfe der Lorenzkurve eine ABC-Analyse durch.

6.2 Bestands- und Bewegungsmassen

Bestandsmassen sind zeitpunktbezogen, Bewegungsmassen beziehen sich auf Zeiträume. Strukturbeschreibungen des Bestands sollten zur Erhöhung des Informationsgehalts durch eine Analyse der die Struktur beeinflussenden Bewegungsgrößen ergänzt werden. Die zeitliche Entwicklung des Bestands in einem Zeitintervall, die Bestandsfunktion, wird durch die aus dem Zeitmengenbestand abgeleiteten Kenngrößen „Durchschnittsbestand“, „Mittlere Verweildauer“ und „Umschlagshäufigkeit“ beschrieben. Bei der Interpretation sollte beachtet werden, auf welchen Zeitraum sich die untersuchte statistische Masse bezieht und welche Streuung sich hinter den Durchschnitt verbirgt.

Begriffe	Symbole	Berechnung
Anfangsbestand im Zeitpunkt a	n_a	n können Mengen- (Stück) oder Wert-einheiten (€) sein
Endbestand im Zeitpunkt b	n_b	
Zugänge im Intervall $[a, b)$	n_{ab}^+	
Abgänge im Intervall $(a, b]$	n_{ab}^-	
Fortschreibung		$n_b = n_a + n_{ab}^+ - n_{ab}^-$
Bestandsfunktion, Bestand im Zeitpunkt t	$n(t)$	$n(t) \geq 0$
Verweildauer der i -ten Einheit in $[a, b]$	d_i	
Zeitmengenbestand in $[a, b]$	D_{ab}	$D_{ab} = \int_a^b n(t) dt = \sum_{i=1}^n d_i$
Durchschnittsbestand in $[a, b]$	B_{ab}	$B_{ab} = \frac{D_{ab}}{b-a}$, oft: $B_{ab} = \frac{n_a + n_b}{2}$ oder $B_{ab} = \frac{n_a + n_1 + \dots + n_{11} + n_b}{13}$
Umschlagshäufigkeit in $[a, b]$	u_{ab}	$u_{ab} = \frac{b-a}{d_{ab}} = \frac{n}{B_{ab}}$, oft: $u_{ab} = \frac{n_{ab}^-}{B_{ab}}$
Mittlere Verweildauer in $[a, b]$	d_{ab}	$d_{ab} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = \frac{b-a}{u_{ab}}$

**Auf-
gabe**

18

Für ein Lager werden folgende Monatsendbestände festgestellt:

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tsd. €	17	15	12	10	10	12	13	12	10	12	15	16

Anfangsbestand: 15 Tsd. €, Zugänge: 469 Tsd. €.

Berechnen Sie: Durchschnittsbestand, Umschlagshäufigkeit, durchschnittliche Lagerdauer.

6.3 Indexzahlen

Der Informationsgehalt statistischer Daten erschließt sich häufig erst im Vergleich, beispielsweise durch Bildung von Verhältniszahlen. Man spricht von *Gliederungszahlen*, wenn die Zählergröße Teil der Nennergröße ist, von *Beziehungszahlen*, wenn Zähler und Nenner sachlich unterschiedliche, jedoch in sinnvoller Beziehung stehende Größen sind und von *Messzahlen*, wenn Zähler und Nenner Teile derselben statistischen Masse sind. Indexzahlen sind gewogene Mittelwerte von Messzahlen. In praktischen Anwendungen dienen Messzahlen meist der Darstellung der zeitlichen Entwicklung wirtschaftsstatistischer Größen. Derartige Zeitreihen von Mengen- und insbesondere Preismesszahlen werden zu Indexreihen aggregiert. In Deutschland wird die Preisentwicklung durch Indizes nach Laspeyres (z.B. Preisindizes für die Lebenshaltung: Basisjahr z.Zt. 2015, d.h. Preise und Mengen des zur Gewichtung verwendeten Warenkorbs von 2015), in Europa durch den HVPI (Harmonisierter Verbraucherpreisindex: Mengen für Deutschland von 2015, Preise des Warenkorbs regelmäßig aktualisiert) gemessen.

Name	Preisindex	Mengenindex	Anwendung
Laspeyres	$P_{0t}^{La} = \frac{\sum_i p_{it} q_{i0}}{\sum_i p_{i0} q_{i0}}$ $= \sum_i g_{i0} \frac{p_{it}}{p_{i0}}$	$Q_{0t}^{La} = \frac{\sum_i p_{i0} q_{it}}{\sum_i p_{i0} q_{i0}}$ $= \sum_i g_{i0} \frac{q_{it}}{q_{i0}}$	Der Preisindex nach Laspeyres erlaubt Vergleiche beliebiger Indexstände, z.B. $P_{t,t-1}^{La} = P_{t0}^{La} : P_{t-1,0}^{La}$. So ist es üblich, den Indexstand des Berichtsmontats vergl. mit dem Indexstand des Vorjahresmontats als Inflationsrate zu bezeichnen. („Wieviel hätte man für einen Warenkorb aus 0 in t mehr als in $t - 1$ bezahlen müssen?“)
	mit $g_{i0} = \frac{p_{i0} q_{i0}}{\sum_i p_{i0} q_{i0}}$		
Paasche	$P_{0t}^{Pa} = \frac{\sum_i p_{it} q_{it}}{\sum_i p_{i0} q_{it}}$ $= \left(\sum_i g_{it} \frac{p_{i0}}{p_{it}} \right)^{-1}$	$Q_{0t}^{Pa} = \frac{\sum_i p_{it} q_{it}}{\sum_i p_{it} q_{i0}}$ $= \left(\sum_i g_{it} \frac{q_{i0}}{q_{it}} \right)^{-1}$	Der Preisindex nach Paasche wird zur Deflationierung (Preisbereinigung) verwendet, indem man die Volumengröße (-entwicklung) durch den „passenden“ Paasche-Preisindex dividiert: $\sum_i p_{it} q_{it} : P_{0t}^{Pa} = \sum_i p_{i0} q_{it}$ („... in Preisen des Basisjahres“). Der sich ergebende Laspeyres'sche Mengenindex lässt wieder beliebige Indexstandvergleiche, z.B. zum Vorjahr, zu. Man spricht von „realer“ Entwicklung.
	mit $g_{it} = \frac{p_{it} q_{it}}{\sum_i p_{it} q_{it}}$		

Aufgabe

19

Für drei Produkte hat man folgende Preise (p_i) und Ausgaben ($p_i q_i$) jeweils zum Basis- (0) und Berichtsjahr (t):

i	p_{i0}	$p_{i0} q_{i0}$	p_{it}	$p_{it} q_{it}$
1	20	100	24	192
2	4	100	8	160
3	10	200	13	273

Berechnen Sie gewogene Mittel der Preissteigerungsraten nach Laspeyres und Paasche sowie nominale und reale Ausgabensteigerungen.

6.4 Regressionsrechnung

Durch die Regressionsrechnung wird der rechnerische Einfluss von erklärenden Variablen auf Zielvariablen untersucht. Der „durchschnittliche“ Einfluss der quantitativen Änderung der erklärenden Variablen auf die erklärte(n) Größe(n) wird hier durch eine lineare Regressionsfunktion abgebildet. Aufgabe der (deskriptiven) Regressionsanalyse ist die Bestimmung der Parameter b_0, b_1, \dots, b_k dieser Funktion $\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_kx_k$.

Methode der kleinsten Quadrate (für Stichprobenumfang n)	
$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1x_1 - b_2x_2 - \dots - b_kx_k)^2 = f(b_0, b_1, \dots, b_k) \longrightarrow \min_{b_0, b_1, \dots, b_k}$	
Lösung: Normalgleichungen	
$\begin{array}{ccccccc} b_0n & + & b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i} & + & b_2 \sum_{i=1}^n x_{2i} & + & \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{ki} & = & \sum_{i=1}^n y_i \\ b_0 \sum_{i=1}^n x_{1i} & + & b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i}^2 & + & b_2 \sum_{i=1}^n x_{1i}x_{2i} & + & \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{1i}x_{ki} & = & \sum_{i=1}^n x_{1i}y_i \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_0 \sum_{i=1}^n x_{ki} & + & b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i}x_{ki} & + & b_2 \sum_{i=1}^n x_{2i}x_{ki} & + & \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{ki}^2 & = & \sum_{i=1}^n x_{ki}y_i \end{array}$	
Bei nur einer erklärenden Variablen: $b_0 \longrightarrow a, b_1 \longrightarrow b \implies \hat{y} = a + bx$	
<p>Normalgleichungen</p> $na + b \sum x_i = \sum y_i$ $a \sum x_i + b \sum x_i^2 = \sum x_i y_i$	<p>Bestimmungsgleichungen</p> $b = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{s_{XY}}{s_X^2}$ $a = \bar{y} - b \bar{x} \text{ (Schwerpunkteigenschaft)}$
Varianzzerlegung	
$\underbrace{\frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{y})^2}_{s_Y^2} = \underbrace{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}_{s_e^2} + \underbrace{\frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{s_{\hat{y}}^2}$	
Bestimmtheitsmaß	
$r^2 = \left(\frac{s_{XY}}{s_X s_Y} \right)^2 = \frac{s_{\hat{y}}^2}{s_Y^2}$	<p>Anteil der durch die Regressionsgerade „erklärten“ Varianz der Zielvariablen, $0 \leq r^2 \leq 1$.</p>

Aufgabe

20

Zwölf Studenten wurden nach ihren monatlichen Einkommen (x_i) und den Ausgaben für die Miete (y_i) befragt (jeweils in 100 €). Man erhielt folgendes Ergebnis:

x_i	8	16	10	12	18	10	12	14	12	8	12	12
y_i	2,0	4,4	3,6	3,6	6,0	3,6	3,2	3,6	4,0	2,4	4,0	2,8

Bestimmen Sie die Regressionsgerade $\hat{y} = a + bx$ nach der Methode der kleinsten Quadrate und berechnen Sie das Bestimmtheitsmaß.

6.5 Zeitreihenanalyse

Die zeitliche Entwicklung wirtschaftsstatistischer Größen dient häufig als Grundlage für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung eben dieser Größe. Zeigen sich Regelmäßigkeiten im Zeitreihenverlauf (z.B. Saisonzyklen und Trends), so versucht man durch rechnerische Verfahren diese Regelmäßigkeit herauszufiltern (z.B. Chartanalysen bei Aktienkursverläufen) oder nur eine Glättung der Reihe zu erreichen (z.B. durch gleitende Durchschnitte).

Gleitende ungewogene Durchschnitte	
Glättung von regelmäßigen Schwankungen innerhalb bestimmter Zeitintervalle während eines Jahres, z.B. Terial oder Quartal, durch gleitende Dreier- und Viererdurchschnitte.	$\bar{x}_t^{(3)} = (x_{t-1} + x_t + x_{t+1}) : 3$ $\bar{x}_t^{(4)} = \left(\frac{1}{2}x_{t-2} + x_{t-1} + x_t + x_{t+1} + \frac{1}{2}x_{t+2} \right) : 4$
Glättung schwankender Zeitreihen, z.B. Aktienkurse. Der Durchschnitt wird als geglätteter Wert dem aktuellsten Wert der Zeitreihe zugeordnet.	$\bar{x}_t^{(90)} = (x_t + x_{t-1} + \dots + x_{t-89}) : 90$ $\bar{x}_t^{(200)} = (x_t + x_{t-1} + \dots + x_{t-199}) : 200$
Gleitende gewogene Durchschnitte: Einfache exponentielle Glättung	
Der geglättete Wert wird als Prognosewert verwendet.	$x_{t+1}^* = \bar{x}_t = \alpha x_t + (1 - \alpha) \bar{x}_{t-1} = \alpha \sum_{i=0}^{\infty} (1 - \alpha)^i x_{t-i}$ <p>meist $0,1 \leq \alpha \leq 0,5$</p>
Komponentenzerlegung: $x_t = f(\hat{x}_t, s_t, u_t) = \hat{x}_t + s_t + u_t$ (additives Modell)	
bei äquidistanter Messung und $t = 1, 2, \dots, T$	
glatte Komponente nach der Methode der kleinsten Quadrate: $\hat{x}_t = a + b \cdot t$	$b = \frac{12 \sum t x_t - 6(T+1) \sum x_t}{T(T^2 - 1)}, \quad a = \bar{x} - \frac{T+1}{2} b$
saisonale Komponente (bei konstanter Saisonfigur): $s_t = s_j, j = 1, \dots, k$ und $t = j, j+k, j+2k, \dots, j+(P-1)k$	$s_j = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^P (x_{ij} - \hat{x}_{ij}), \quad j = 1, 2, \dots, k$ <p>j: Unterzeitraum (z.B. Quartal) der Periode i (z.B. Jahr), k: Anzahl der Unterzeiträume, P: Anzahl der Perioden</p>
saisonbereinigte Werte \tilde{x}_t	$\tilde{x}_t = x_t - s_t$
prognostizierte Werte x_t^*	$x_t^* = \hat{x}_t + s_t, \text{ mit } s_t = s_j, j = 1, \dots, k \text{ und } t = j + Pk$

Aufgabe

21

Die Firma Hoch- und Tiefbau AG hatte in den letzten drei Jahren folgende Auftragsbestände (Mio €) jeweils zum Quartalsende:

Jahr	1				2				3			
Quartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mio. €	24	18	13	17	21	16	14	16	21	14	12	15

Zeichnen Sie die Zeitreihe und berechnen Sie gleitende Viererdurchschnitte, einen linearen Trend, die saisonalen Komponenten und prognostizieren Sie die Auftragsbestände für das nächste Jahr.

Häufig angewandte Prognoseverfahren mit exponentieller Glättung für eine Zeitreihe (x_t) , $t=1,2,\dots,T$

Prognoseverfahren	Mathematisches Modell	geglättete Werte	Prognosewert	Initialisierung z.B.	Interpretation / Anwendung
Exponentielle Glättung 1. Ordnung	$x_t = a_t + u_t$ x_t : Beobachtungswert a_t : Niveauwert u_t : Störterm	$\bar{x}_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)\bar{x}_{t-1}$ \bar{x}_t : geschätzter Niveauwert α : Glättungsparameter mit $0 < \alpha \leq 1$	$x_{t+1}^* = \bar{x}_t$ $= \alpha x_t + (1 - \alpha)x_t^*$ $x_{T+m}^* = x_{T+1}^*$, $m \geq 1$	$x_1^* = x_1$ für $x_{t+1}^* = \alpha \sum_{i=0}^{t-1} (1 - \alpha)^i x_{t-i} + (1 - \alpha)^t x_1^*$	Je höher α gewählt wird, desto stärker reagiert die Prognose auf aktuelle Werte und desto weniger wird geglättet.
Exponentielle Glättung 2. Ordnung bzw. Trendkorrekturversion (Modell von Brown)	$x_t = a_t + b_t t + u_t$ x_t : Beobachtungswert a_t : Niveauwert b_t : Trendanstieg/abstieg u_t : Störterm	$\bar{x}_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)\bar{x}_{t-1}$ $\bar{\bar{x}}_t = \alpha \bar{x}_t + (1 - \alpha)\bar{\bar{x}}_{t-1}$ α : Glättungsparameter, $0 < \alpha \leq 1$	$x_{t+1}^* = 2\bar{x}_t - \bar{\bar{x}}_{t-1}$ $x_{T+m}^* = 2\bar{x}_T - \bar{\bar{x}}_{T-1} + (m-1)\alpha(\bar{x}_T - \bar{\bar{x}}_{T-1})$, $m \geq 2$	$\bar{x}_2 = x_2$ $\bar{\bar{x}}_1 = x_1$	Die erste Version schreibt die Modellparameter bei der Glättung einfach fort, während die zweite äquivalente Version den Niveauwert und den Trendanstieg/abstieg glättet und in der Prognose eine Trendkorrektur vornimmt.
		$\bar{x}_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)\bar{x}_{t-1}$ $\bar{\bar{x}}_t = \alpha(\bar{x}_t - \bar{\bar{x}}_{t-1}) + (1 - \alpha)\bar{\bar{x}}_{t-1}$ \bar{x}_t : geschätzter Niveauwert $\bar{\bar{x}}_t$: geschätzter Trendanstieg/abstieg α : Glättungsparameter, $0 < \alpha \leq 1$	$x_{t+1}^* = \bar{x}_t + \bar{\bar{x}}_t + \frac{1 - \alpha}{\alpha} \bar{\bar{x}}_t$ $x_{T+m}^* = \bar{x}_T + \bar{\bar{x}}_T \cdot m + \frac{1 - \alpha}{\alpha} \bar{\bar{x}}_T$, $m \geq 1$	$\bar{x}_2 = x_2$ $\bar{\bar{x}}_2 = \alpha(x_2 - x_1)$	
Lineare exponentielle Glättung von Holt-Winters	$x_t = a_t + b_t t + u_t$ x_t : Beobachtungswert a_t : Niveauwert b_t : Trendanstieg/abstieg u_t : Störterm	$\bar{x}_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)(\bar{x}_{t-1} + \bar{\bar{x}}_{t-1})$ $\bar{\bar{x}}_t = \beta(\bar{x}_t - \bar{x}_{t-1}) + (1 - \beta)\bar{\bar{x}}_{t-1}$ \bar{x}_t : geschätzter Niveauwert $\bar{\bar{x}}_t$: geschätzter Trendanstieg/abstieg α, β : Glättungsparameter, $0 < \alpha, \beta \leq 1$	$x_{t+1}^* = \bar{x}_t + \bar{\bar{x}}_t$ $x_{T+m}^* = \bar{x}_T + \bar{\bar{x}}_T \cdot m$, $m \geq 1$	$\bar{x}_2 = x_2$ $\bar{\bar{x}}_2 = x_2 - x_1$	Bereits bei der Schätzung des Niveauwertes wird der Trendanstieg/abstieg berücksichtigt. Je höher β , desto stärker reagiert die Prognose auf den aktuellen Trend.
Exponentielle Glättung des additiven saisonalen Modells von Holt-Winters	$x_t = a_t + b_t t + s_t + u_t$ x_t : Beobachtungswert a_t : Niveauwert b_t : Trendanstieg/abstieg s_t : Saisonkomponente u_t : Störterm Jede Periode hat k Unterzeiträume. P sei die Anzahl der Perioden.	$\bar{x}_t = \alpha(x_t - \check{x}_{t-k}) + (1 - \alpha)(\bar{x}_{t-1} + \bar{\bar{x}}_{t-1})$ $\bar{\bar{x}}_t = \beta(\bar{x}_t - \bar{x}_{t-1}) + (1 - \beta)\bar{\bar{x}}_{t-1}$ $\check{x}_t = \gamma(x_t - \bar{x}_t) + (1 - \gamma)\check{x}_{t-k}$ \bar{x}_t : geschätzter Niveauwert $\bar{\bar{x}}_t$: geschätzter Trendanstieg/abstieg \check{x}_t : geschätzte Saisonkomponente $\check{x}_t = \check{x}_j$, $j = 1, \dots, k$ und $t = j, j+k, j+2k, \dots, j+(P-1)k$ α, β, γ : Glättungsparameter mit $0 < \alpha, \beta, \gamma \leq 1$	$x_{t+1}^* = \bar{x}_t + \bar{\bar{x}}_t + \check{x}_{t+1-k}$ $x_{T+m}^* = \bar{x}_T + \bar{\bar{x}}_T \cdot m + \check{x}_{T+m-r}$ $r = \begin{cases} k & \text{für } m = 1, \dots, k \\ 2k & \text{für } m = k+1, \dots, 2k \\ 3k & \text{für } m = 2k+1, \dots, 3k \\ \vdots & \end{cases}$	$\bar{x}_{k+1} = x_{k+1}$ $\bar{\bar{x}}_{k+1} = \frac{x_{k+1} - x_1}{k}$ $\check{x}_t = x_t - (\bar{\bar{x}}_{k+1} \cdot t + x_1 - \bar{\bar{x}}_{k+1})$, $t = 1, \dots, k$	Bei einer Zeitreihe mit variierender Tendenz und saisonalen über die Zeit stabilen Schwankungen. Je höher α bzw. β bzw. γ gewählt wird, desto stärker reagiert die Prognose auf aktuelle Werte bzw. die aktuelle Tendenz bzw. die aktuellen saisonalen Schwankungen.
Exponentielle Glättung des multiplikativen saisonalen Modells von Holt-Winters	$x_t = (a_t + b_t t) s_t + u_t$ Variablendefinition vgl. additives Modell	$\bar{x}_t = \alpha \frac{x_t}{\check{x}_{t-k}} + (1 - \alpha)(\bar{x}_{t-1} + \bar{\bar{x}}_{t-1})$ $\bar{\bar{x}}_t = \beta(\bar{x}_t - \bar{x}_{t-1}) + (1 - \beta)\bar{\bar{x}}_{t-1}$ $\check{x}_t = \gamma \frac{x_t}{\bar{x}_t} + (1 - \gamma)\check{x}_{t-k}$ Variablendefinition vgl. additives Modell	$x_{t+1}^* = (\bar{x}_t + \bar{\bar{x}}_t) \check{x}_{t+1-k}$ $x_{T+m}^* = (\bar{x}_T + \bar{\bar{x}}_T m) \check{x}_{T+m-r}$ $r = \begin{cases} k & \text{für } m = 1, \dots, k \\ 2k & \text{für } m = k+1, \dots, 2k \\ 3k & \text{für } m = 2k+1, \dots, 3k \\ \vdots & \end{cases}$	$\bar{x}_{k+1} = x_{k+1}$ $\bar{\bar{x}}_{k+1} = \frac{x_{k+1} - x_1}{k}$ $\check{x}_t = \frac{x_t}{\bar{\bar{x}}_{k+1} \cdot t + x_1 - \bar{\bar{x}}_{k+1}}$, $t = 1, \dots, k$	Bei einer Zeitreihe mit variierender Tendenz und saisonalen über die Zeit variierenden Schwankungen (z.B.: Je größer der Abstand zwischen den Beobachtungen, desto höher die saisonale Komponente).

6.6 Die Normalverteilung als Risikoverteilung

In der Finanzmarktstatistik sind die wichtigsten Kenngrößen von Messzahlenreihen Erwartungswerte, Streuungen (Volatilitäten), Regressionskoeffizienten sowie Korrelationen. Das Standardmodell für Zufallseinflüsse ist die Normalverteilung, die die Berechnung von Konfidenzaussagen für (künftige) Realisationen der Messzahlen erlaubt.

Begriff	Symbole	Aussage
Wachstums- faktoren -raten	$\frac{x_1}{x_0}, \frac{x_2}{x_1}, \dots, \frac{x_T}{x_{T-1}}$ $\frac{x_1 - x_0}{x_0}, \frac{x_2 - x_1}{x_1}, \dots, \frac{x_T - x_{T-1}}{x_{T-1}}$	Messzahlenreihe, die die periodischen Veränderungen abbildet
Geometrisches Mittel	$g = \sqrt[T]{\frac{x_T}{x_0}} = \sqrt[T]{\prod_{t=1}^T \frac{x_t}{x_{t-1}}}$	Durchschnittliche Verzinsung bei Wiederanlage
Durchschnitts- rendite	$\mu_r = \ln \sqrt[T]{\prod_{t=1}^T \frac{x_t}{x_{t-1}}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \ln \frac{x_t}{x_{t-1}}$	Ln des geometrischen Mittels als Erwartungswert der Normalverteilung
Standardab- weichung der Renditen	$\sigma_r = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T \left(\ln \frac{x_t}{x_{t-1}} - \mu_r \right)^2}$	Volatilität der Renditen, Schätzfunktion der Standardabweichung der Normalverteilung
Durchschnitts- rendite eines Portfolios	$\mu_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_{r,i}$ $\mu_p \sum_i x_i = \mu_p(x) = \sum_i x_i \mu_{r,i} = \sum_i \mu_{r,i}(x)$	Erwartete(r) Rendite (Wert) eines Portfolios aus n Anlagen
Standardab- weichung einer Summe	$\sigma_p = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_i \sigma_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} \sum_j \sigma_{ij}}$ $\sigma_p(x) = \sqrt{\sum_i x_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} \sum_j x_i x_j \sigma_{ij}}$	Volatilität der Portfoliorendite bzw. des Portfoliowertes
Value at Risk VaR	$VaR_i = z \cdot x_i \sigma_{r,i} = z \cdot \sigma_{r,i}(x)$ $VaR_p = z \cdot \sigma_p(x)$	Bei einem bestimmten Konfidenzniveau (z) erwarteter Höchstverlust innerhalb eines Zeitintervalls
Beta Volatilität	$\beta_{i,p} = \frac{\sigma_{i,p}}{\sigma_p^2}$	Renditeänderung einer Anlage in Abh. von der Renditeänderung des Portfolios

Aufgabe

22

Ein Hausbesitzer bekommt eine Lebensversicherung in Höhe von 40 000 € ausbezahlt. In 4 Jahren ist der letzte Hypothekenkredit von 32 000 € fällig. Ein Freund gibt ihm den Tipp einer „todsicheren“ Anlage mit mindestens 12% Jahreszins. Bei Recherchen über „google“ erfährt der Hausbesitzer, dass die Jahresvolatilität dieser Anlage 30% beträgt.

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei vollständiger Investition in den „Tipp“ in 4 Jahren wenigstens noch 32 000 € hat? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens der Tipp eintrifft?
- Sein Bankberater rät ihm, die Hälfte bei seiner Bank zu einem jährlichen Festzins von 4% vier Jahre anzulegen. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er noch 32 000 Euro hat?

6.7 Stichproben im Rechnungswesen, Stichprobeninventur

Stichproben im Rechnungswesen dienen der Qualitätssicherung. Wird das Inventar durch eine Zufallsstichprobe erfasst, so hat diese Stichprobeninventur als Hauptaufgabe die Schätzung eines Bilanzansatzes, z.B. des Vorratsvermögens. Gleichzeitig kann sie auch für Zwecke der Qualitätskontrolle eingesetzt werden.

Erhebungsziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, interne und externe Fehlerkontrolle, Schätzung von Vermögenswerten
Abgrenzung der Gesamtheit	Lagerarten, Abgrenzung von Lagerkollektiven, vollständige Auswahlliste, Ausgrenzung von Sonderposten (z.B. Nullpositionen), Bestandsicherung bei Bewegungen während der Aufnahme
Erhebungsmerkmale	Art, Menge, Wert, Fehler (quantitativ/qualitativ)
Erhebungsverfahren	Beobachtung, Befragung
Auswahlverfahren	cut-off, typische Auswahl, Zufallsauswahl
Organisation	Zählereinteilung, Schulung, laufende Kontrollen, Zeitplanung, notwendiger Umfang
Hochrechnung (nur Zufallsauswahl)	<p>Einfach $\hat{X} = N\bar{x}$</p> <p>Geschichtet $\hat{X} = \sum N_h \cdot \bar{x}_h$</p> <p>Differenzen $\hat{X} = Y + (\bar{x} - \bar{y})N$</p> <p>PPS $\hat{X} = \frac{Y}{n} \sum \frac{x_i}{y_i}$</p>
Ergebnisbeurteilung Fehlerrechnung Testergebnis	<p>Subjektive Wertung, bei Zufallsstichproben durch Varianzberechnungen quantifiziert (hier m.Z. für den Totalwert \hat{X})</p> <p>Einfach $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{N^2}{n} \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$</p> <p>Geschichtet $\hat{\sigma}_x^2 = \sum \frac{s_h^2}{n_h} N_h^2$</p> <p>Differenzen $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{N^2}{n} \frac{1}{n-1} \sum [(x_i - y_i) - (\bar{x} - \bar{y})]^2$</p> <p>PPS $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{Y^2}{n} \frac{1}{n-1} \sum \left(\frac{x_i}{y_i} - \sum \frac{x_i}{y_i} \right)^2$</p>
Präsentation	Einstellung in Bilanz, interner Qualitätsbericht, externer Prüfungsbericht („Bestätigungsvermerk“)

**Auf-
gabe**
23

Bei der Stichprobeninventur in einem Unternehmen wird folgendermaßen verfahren. Die Schätzung des Gesamtwertes der 60 000 Positionen eines Lagerkollektivs erfolgt über ein geschichtetes Stichprobenverfahren bei proportionaler Aufteilung. Der zulässige Stichprobenfehler darf bei einem Konfidenzniveau von 95,45% nicht mehr als 2% betragen. Zusätzlich wird geprüft, wie hoch der Anteil der Fehler (Inventurdifferenzen: ja/nein) ist. Sind 1% oder weniger Fälle festzustellen, gibt es keine Beanstandungen, bei 4% oder mehr wird die Stichprobeninventur durch ein anderes Verfahren ersetzt.

Man erhält folgende Ergebnisse der Stichprobenziehung ($n = 1\,000$)

Schicht h	N_h	n_h	$\sum_{i=1}^{n_h} x_{ih}$	$\sum_{i=1}^{n_h} x_{ih}^2$
1	30 000	500	2 500	14 500,0
2	18 000	300	3 000	31 200,0
3	9 000	150	3 000	61 350,0
4	3 000	50	1 500	45 612,5
Σ	60 000	1 000	10 000	152 662,5

Bei 20 Posten wurden Inventurdifferenzen festgestellt.

- Schätzen Sie den Lagergesamtwert und den Stichprobenfehler.
- Berechnen und interpretieren Sie den α - bzw. β -Fehler bei einer Entscheidung aufgrund des Stichprobenergebnisses.

Anhang: Tafeln zu einigen wichtigen Verteilungen

A Standardnormalverteilung

Vertafelt sind die Werte der Verteilungsfunktion $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ für $z \geq 0$.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999

B t -Verteilung

Vertafelt sind die Werte von t zu gegebenen Werten der Verteilungsfunktion für v Freiheitsgrade. Für $t_{1-\alpha}(v)$ gilt $F(t_{1-\alpha}(v)) = 1 - \alpha$.

v	$1 - \alpha$									
	0,600	0,700	0,750	0,800	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	0,999
1	0,325	0,727	1,000	1,376	3,078	6,314	12,706	31,821	63,656	318,289
2	0,289	0,617	0,816	1,061	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,328
3	0,277	0,584	0,765	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,214
4	0,271	0,569	0,741	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173
5	0,267	0,559	0,727	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,894
6	0,265	0,553	0,718	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208
7	0,263	0,549	0,711	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785
8	0,262	0,546	0,706	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501
9	0,261	0,543	0,703	0,883	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297
10	0,260	0,542	0,700	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144
11	0,260	0,540	0,697	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025
12	0,259	0,539	0,695	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930
13	0,259	0,538	0,694	0,870	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852
14	0,258	0,537	0,692	0,868	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787
15	0,258	0,536	0,691	0,866	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733
16	0,258	0,535	0,690	0,865	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686
17	0,257	0,534	0,689	0,863	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646
18	0,257	0,534	0,688	0,862	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610
19	0,257	0,533	0,688	0,861	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579
20	0,257	0,533	0,687	0,860	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552
21	0,257	0,532	0,686	0,859	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527
22	0,256	0,532	0,686	0,858	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505
23	0,256	0,532	0,685	0,858	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485
24	0,256	0,531	0,685	0,857	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467
25	0,256	0,531	0,684	0,856	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450
26	0,256	0,531	0,684	0,856	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435
27	0,256	0,531	0,684	0,855	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421
28	0,256	0,530	0,683	0,855	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408
29	0,256	0,530	0,683	0,854	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396
30	0,256	0,530	0,683	0,854	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385
40	0,255	0,529	0,681	0,851	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307
50	0,255	0,528	0,679	0,849	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261
100	0,254	0,526	0,677	0,845	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174
150	0,254	0,526	0,676	0,844	1,287	1,655	1,976	2,351	2,609	3,145
∞	0,253	0,524	0,674	0,842	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090

C Chi-Quadrat-Verteilung

Vertafelt sind die Werte von χ^2 zu gegebenen Werten der Verteilungsfunktion für ν Freiheitsgrade. Für $\chi^2_{1-\alpha}(\nu)$ gilt $F(\chi^2_{1-\alpha}(\nu)) = 1 - \alpha$. Approximation für $\nu > 35$: $\chi^2_{1-\alpha}(\nu) \approx \frac{1}{2}(z_{1-\alpha} + \sqrt{2\nu - 1})^2$.

ν	$1 - \alpha$									
	0,600	0,700	0,800	0,900	0,950	0,975	0,980	0,990	0,995	0,999
1	0,708	1,074	1,642	2,706	3,841	5,024	5,412	6,635	7,879	10,827
2	1,833	2,408	3,219	4,605	5,991	7,378	7,824	9,210	10,597	13,815
3	2,946	3,665	4,642	6,251	7,815	9,348	9,837	11,345	12,838	16,266
4	4,045	4,878	5,989	7,779	9,488	11,143	11,668	13,277	14,860	18,466
5	5,132	6,064	7,289	9,236	11,070	12,832	13,388	15,086	16,750	20,515
6	6,211	7,231	8,558	10,645	12,592	14,449	15,033	16,812	18,548	22,457
7	7,283	8,383	9,803	12,017	14,067	16,013	16,622	18,475	20,278	24,321
8	8,351	9,524	11,030	13,362	15,507	17,535	18,168	20,090	21,955	26,124
9	9,414	10,656	12,242	14,684	16,919	19,023	19,679	21,666	23,589	27,877
10	10,473	11,781	13,442	15,987	18,307	20,483	21,161	23,209	25,188	29,588
11	11,530	12,899	14,631	17,275	19,675	21,920	22,618	24,725	26,757	31,264
12	12,584	14,011	15,812	18,549	21,026	23,337	24,054	26,217	28,300	32,909
13	13,636	15,119	16,985	19,812	22,362	24,736	25,471	27,688	29,819	34,527
14	14,685	16,222	18,151	21,064	23,685	26,119	26,873	29,141	31,319	36,124
15	15,733	17,322	19,311	22,307	24,996	27,488	28,259	30,578	32,801	37,698
16	16,780	18,418	20,465	23,542	26,296	28,845	29,633	32,000	34,267	39,252
17	17,824	19,511	21,615	24,769	27,587	30,191	30,995	33,409	35,718	40,791
18	18,868	20,601	22,760	25,989	28,869	31,526	32,346	34,805	37,156	42,312
19	19,910	21,689	23,900	27,204	30,144	32,852	33,687	36,191	38,582	43,819
20	20,951	22,775	25,038	28,412	31,410	34,170	35,020	37,566	39,997	45,314
21	21,992	23,858	26,171	29,615	32,671	35,479	36,343	38,932	41,401	46,796
22	23,031	24,939	27,301	30,813	33,924	36,781	37,659	40,289	42,796	48,268
23	24,069	26,018	28,429	32,007	35,172	38,076	38,968	41,638	44,181	49,728
24	25,106	27,096	29,553	33,196	36,415	39,364	40,270	42,980	45,558	51,179
25	26,143	28,172	30,675	34,382	37,652	40,646	41,566	44,314	46,928	52,619
26	27,179	29,246	31,795	35,563	38,885	41,923	42,856	45,642	48,290	54,051
27	28,214	30,319	32,912	36,741	40,113	43,195	44,140	46,963	49,645	55,475
28	29,249	31,391	34,027	37,916	41,337	44,461	45,419	48,278	50,994	56,892
29	30,283	32,461	35,139	39,087	42,557	45,722	46,693	49,588	52,335	58,301
30	31,316	33,530	36,250	40,256	43,773	46,979	47,962	50,892	53,672	59,702
31	32,349	34,598	37,359	41,422	44,985	48,232	49,226	52,191	55,002	61,098
32	33,381	35,665	38,466	42,585	46,194	49,480	50,487	53,486	56,328	62,487
33	34,413	36,731	39,572	43,745	47,400	50,725	51,743	54,775	57,648	63,869
34	35,444	37,795	40,676	44,903	48,602	51,966	52,995	56,061	58,964	65,247
35	36,475	38,859	41,778	46,059	49,802	53,203	54,244	57,342	60,275	66,619

D F-Verteilung

Vertafelt sind die Werte von f zu gegebenen Werten der Verteilungsfunktion für (v_1, v_2) Freiheitsgrade. Für $f_{1-\alpha}(v_1, v_2)$ gilt $F(f_{1-\alpha}(v_1, v_2)) = 1 - \alpha$.

v_1	$1 - \alpha$	v_2										
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0,900	2,975	2,961	2,949	2,937	2,927	2,918	2,909	2,901	2,894	2,887	2,881
1	0,950	4,351	4,325	4,301	4,279	4,260	4,242	4,225	4,210	4,196	4,183	4,171
1	0,975	5,871	5,827	5,786	5,750	5,717	5,686	5,659	5,633	5,610	5,588	5,568
1	0,990	8,096	8,017	7,945	7,881	7,823	7,770	7,721	7,677	7,636	7,598	7,562
2	0,900	2,589	2,575	2,561	2,549	2,538	2,528	2,519	2,511	2,503	2,495	2,489
2	0,950	3,493	3,467	3,443	3,422	3,403	3,385	3,369	3,354	3,340	3,328	3,316
2	0,975	4,461	4,420	4,383	4,349	4,319	4,291	4,265	4,242	4,221	4,201	4,182
2	0,990	5,849	5,780	5,719	5,664	5,614	5,568	5,526	5,488	5,453	5,420	5,390
3	0,900	2,380	2,365	2,351	2,339	2,327	2,317	2,307	2,299	2,291	2,283	2,276
3	0,950	3,098	3,072	3,049	3,028	3,009	2,991	2,975	2,960	2,947	2,934	2,922
3	0,975	3,859	3,819	3,783	3,750	3,721	3,694	3,670	3,647	3,626	3,607	3,589
3	0,990	4,938	4,874	4,817	4,765	4,718	4,675	4,637	4,601	4,568	4,538	4,510
4	0,900	2,249	2,233	2,219	2,207	2,195	2,184	2,174	2,165	2,157	2,149	2,142
4	0,950	2,866	2,840	2,817	2,796	2,776	2,759	2,743	2,728	2,714	2,701	2,690
4	0,975	3,515	3,475	3,440	3,408	3,379	3,353	3,329	3,307	3,286	3,267	3,250
4	0,990	4,431	4,369	4,313	4,264	4,218	4,177	4,140	4,106	4,074	4,045	4,018
5	0,900	2,158	2,142	2,128	2,115	2,103	2,092	2,082	2,073	2,064	2,057	2,049
5	0,950	2,711	2,685	2,661	2,640	2,621	2,603	2,587	2,572	2,558	2,545	2,534
5	0,975	3,289	3,250	3,215	3,183	3,155	3,129	3,105	3,083	3,063	3,044	3,026
5	0,990	4,103	4,042	3,988	3,939	3,895	3,855	3,818	3,785	3,754	3,725	3,699
6	0,900	2,091	2,075	2,060	2,047	2,035	2,024	2,014	2,005	1,996	1,988	1,980
6	0,950	2,599	2,573	2,549	2,528	2,508	2,490	2,474	2,459	2,445	2,432	2,421
6	0,975	3,128	3,090	3,055	3,023	2,995	2,969	2,945	2,923	2,903	2,884	2,867
6	0,990	3,871	3,812	3,758	3,710	3,667	3,627	3,591	3,558	3,528	3,499	3,473
7	0,900	2,040	2,023	2,008	1,995	1,983	1,971	1,961	1,952	1,943	1,935	1,927
7	0,950	2,514	2,488	2,464	2,442	2,423	2,405	2,388	2,373	2,359	2,346	2,334
7	0,975	3,007	2,969	2,934	2,902	2,874	2,848	2,824	2,802	2,782	2,763	2,746
7	0,990	3,699	3,640	3,587	3,539	3,496	3,457	3,421	3,388	3,358	3,330	3,305
8	0,900	1,999	1,982	1,967	1,953	1,941	1,929	1,919	1,909	1,900	1,892	1,884
8	0,950	2,447	2,420	2,397	2,375	2,355	2,337	2,321	2,305	2,291	2,278	2,266
8	0,975	2,913	2,874	2,839	2,808	2,779	2,753	2,729	2,707	2,687	2,669	2,651
8	0,990	3,564	3,506	3,453	3,406	3,363	3,324	3,288	3,256	3,226	3,198	3,173
9	0,900	1,965	1,948	1,933	1,919	1,906	1,895	1,884	1,874	1,865	1,857	1,849
9	0,950	2,393	2,366	2,342	2,320	2,300	2,282	2,265	2,250	2,236	2,223	2,211
9	0,975	2,837	2,798	2,763	2,731	2,703	2,677	2,653	2,631	2,611	2,592	2,575
9	0,990	3,457	3,398	3,346	3,299	3,256	3,217	3,182	3,149	3,120	3,092	3,067

v_1	$1 - \alpha$	v_2										
		40	50	60	70	80	90	100	120	150	200	∞
1	0,900	2,835	2,809	2,791	2,779	2,769	2,762	2,756	2,748	2,739	2,731	2,706
1	0,950	4,085	4,034	4,001	3,978	3,960	3,947	3,936	3,920	3,904	3,888	3,841
1	0,975	5,424	5,340	5,286	5,247	5,218	5,196	5,179	5,152	5,126	5,100	5,024
1	0,990	7,314	7,171	7,077	7,011	6,963	6,925	6,895	6,851	6,807	6,763	6,635
2	0,900	2,440	2,412	2,393	2,380	2,370	2,363	2,356	2,347	2,338	2,329	2,303
2	0,950	3,232	3,183	3,150	3,128	3,111	3,098	3,087	3,072	3,056	3,041	2,996
2	0,975	4,051	3,975	3,925	3,890	3,864	3,844	3,828	3,805	3,781	3,758	3,689
2	0,990	5,178	5,057	4,977	4,922	4,881	4,849	4,824	4,787	4,749	4,713	4,605
3	0,900	2,226	2,197	2,177	2,164	2,154	2,146	2,139	2,130	2,121	2,111	2,084
3	0,950	2,839	2,790	2,758	2,736	2,719	2,706	2,696	2,680	2,665	2,650	2,605
3	0,975	3,463	3,390	3,343	3,309	3,284	3,265	3,250	3,227	3,204	3,182	3,116
3	0,990	4,313	4,199	4,126	4,074	4,036	4,007	3,984	3,949	3,915	3,881	3,782
4	0,900	2,091	2,061	2,041	2,027	2,016	2,008	2,002	1,992	1,983	1,973	1,945
4	0,950	2,606	2,557	2,525	2,503	2,486	2,473	2,463	2,447	2,432	2,417	2,372
4	0,975	3,126	3,054	3,008	2,975	2,950	2,932	2,917	2,894	2,872	2,850	2,786
4	0,990	3,828	3,720	3,649	3,600	3,563	3,535	3,513	3,480	3,447	3,414	3,319
5	0,900	1,997	1,966	1,946	1,931	1,921	1,912	1,906	1,896	1,886	1,876	1,847
5	0,950	2,449	2,400	2,368	2,346	2,329	2,316	2,305	2,290	2,274	2,259	2,214
5	0,975	2,904	2,833	2,786	2,754	2,730	2,711	2,696	2,674	2,652	2,630	2,566
5	0,990	3,514	3,408	3,339	3,291	3,255	3,228	3,206	3,174	3,142	3,110	3,017
6	0,900	1,927	1,895	1,875	1,860	1,849	1,841	1,834	1,824	1,814	1,804	1,774
6	0,950	2,336	2,286	2,254	2,231	2,214	2,201	2,191	2,175	2,160	2,144	2,099
6	0,975	2,744	2,674	2,627	2,595	2,571	2,552	2,537	2,515	2,494	2,472	2,408
6	0,990	3,291	3,186	3,119	3,071	3,036	3,009	2,988	2,956	2,924	2,893	2,802
7	0,900	1,873	1,840	1,819	1,804	1,793	1,785	1,778	1,767	1,757	1,747	1,717
7	0,950	2,249	2,199	2,167	2,143	2,126	2,113	2,103	2,087	2,071	2,056	2,010
7	0,975	2,624	2,553	2,507	2,474	2,450	2,432	2,417	2,395	2,373	2,351	2,288
7	0,990	3,124	3,020	2,953	2,906	2,871	2,845	2,823	2,792	2,761	2,730	2,639
8	0,900	1,829	1,796	1,775	1,760	1,748	1,739	1,732	1,722	1,712	1,701	1,670
8	0,950	2,180	2,130	2,097	2,074	2,056	2,043	2,032	2,016	2,001	1,985	1,938
8	0,975	2,529	2,458	2,412	2,379	2,355	2,336	2,321	2,299	2,278	2,256	2,192
8	0,990	2,993	2,890	2,823	2,777	2,742	2,715	2,694	2,663	2,632	2,601	2,511
9	0,900	1,793	1,760	1,738	1,723	1,711	1,702	1,695	1,684	1,674	1,663	1,632
9	0,950	2,124	2,073	2,040	2,017	1,999	1,986	1,975	1,959	1,943	1,927	1,880
9	0,975	2,452	2,381	2,334	2,302	2,277	2,259	2,244	2,222	2,200	2,178	2,114
9	0,990	2,888	2,785	2,718	2,672	2,637	2,611	2,590	2,559	2,528	2,497	2,407